





三都  
發行  
書林

京都三条通升屋町

出雲寺文次郎

大坂心齋橋

通北久太郎町

河内屋喜兵衛

同博勞町

河内屋茂兵衛

同安堂寺町

秋田屋太右衛門

江戸芝神明前

岡田屋嘉七

同日本橋通二丁目

山城屋佐兵衛

同壹町目

須原屋茂兵衛

同淺草茅町二丁目

須原屋伊八

同本町

大助板



證治通義

二十卷 同前

ヲ羽翼ノ經意ヲ擴充シ事實大有用ノモノニ  
此書ハ病因診察辨證ノ要領用某治病ノ法則方劑某物ノ理蓋マデ諸  
家ノ精說ヲ摘出シテ攷証ヲ加ヘ醫ヲ學ブモノヲ早ク正路ニ入ル秘訣ニ  
傷寒六經志 一卷 加藤猶龍先生著

三陰三陽ヲ以テ更ニ細分ヲナシ一百十三方ヲ配列シ方ゴトニ因證脉治ヲ揭  
ケ劑ノ大意ヲ示タル書ニコレヲ藥籠中ニ藏テ至テ便利ナル書ナリ

產科指南

二卷 多紀菴庭先生闢 大牧周西先生著

此書ハ賀川氏ニ本キテ國字モテ其手術証候治法等ヲ演  
說ナシタルモノニ先生ハ產術ニ妙ヲ得タル人ニメ數十年間經  
驗スルトゴロヨリメ賀川氏ノ未逮ヲ幾スルヲマタ多シ且  
其論說至テ深切ニメイカナル初學トイヘ疋曉ヤスカラシム誠ニ  
良師ニヨラスメ產術ノ秘訣ヲ得ルノ鴻寶ナリ





難經疏證

二卷 同前

難經ノ注ハ頗多ケレモ大抵迂遠ニシテ且舊古ニ疎シ今先生諸注ノ的切ナルヲ擇ビ更ニ攷證ヲ加ヘタル書ヲ標窓先生ノ醫經諸解ト並ニ讀セズハアラザルモノシ

名醫彙論

八十卷

多紀菴庭先生著

古人ノ病論異同ノ說悉ク載ズトイフコトクニ病就テ名義脉法原因證候治法ヲ析タル大成ノ書ニ

傷寒論述義

二卷 同前

此書ハ輯義ノ餘意ヲ發明ノ三陽三陰ノ大義變壞ノ諸候ニ至ルデ類論辨列ヲナレ仲景ノ條理ヲレテ一目了然タラシメ治術ニライテ明切ナル書ニシテ敢テ立言ニ急ナルモノニアラズ

傷寒廣要

十二卷 同前

此書ハ古人傷寒ノ治術ニライテ切正ナル論方ヲ類録シタル書ナリ輯義



櫟陰先生文集

五卷

先生ノ文ハ敢テ巧ヲ求ルニ意ナシトイヘ能俗習ヲ脱メ自ラ雅麗ナリ且醫書ノ攷證證治ノ論說等發明スルトコ多ク其中ニアリ

醫籍考

百卷 多紀柳汴先生著

此書ハ朱竹垞經義考ニ倣テ古來醫書ノ目錄ヲ類列シタルモノニ歴代ノ史志及ビ百家ノ書ニ就テ卷帙序跋ヲ擧ゲ並ニ作者ノ履歷ヲ訂シ存佚未見ヲ表シ書ノ佳否道ノ源流燦然トシ明ナリ

疾雅

三十卷 同前

醫ノ事ハ病名ヨリ繁雜ナルナシト先生博ク攷覈ヲナシテ正俗ヲ訂シ異同ヲ辨シテ以テコレヲ約ニ歸セシムル書ニ

名醫公案

五十卷 同前

此書ハ諸家治驗ノ巧妙ナルヲ纂錄シタルモノ古人臨證處治ノ曲折ヲ會得

レコレヲ今日ニ運用セントスル此書ヨリ善キハナシ



醫方挈領

此書ハ方ノ祖ヲアゲ

四君子湯四物湯ノ類ノ如キ是ナリ

フレニ加減ノレタル類方ヲ集タルモノニテ出典治

證ヲアゲ王良燦ノ小青囊施沛然ノ祖劑ナドニ比セバソノ精博數倍ノ実ニ彙龍

中缺ベカラサル書ニ

麻疹心得

麻疹輯要方

麻疹纂類

各一卷

合刻二冊

同前

心得ハ先生數次經驗ノ治術ヲ詳ニ國字モテ録シタル書ナリ輯要方ハ諸家ノ

名方ヲ集メ纂類ハ諸説ノ要ヲ摘タルモノニノコノ三書アリテ治疹ノ事拾芥ヨリ

易レトイフベシ

標窓類鈔

八十卷

同前

此書ハ儒書ノ中ヨリ醫ニアツカリタルヲ摘出シ類ヲ以テ纂録シタルモノニ

醫ノ政令ヲ始トシ證治方藥ノコハイフニ及ズ書目醫傳並ニ詩文ノ類マデモ

悉ク採入セズトイフニテ先生ノ博覽古來醫家ツノ比ナク此書亦天下

所未曾有ノ盛舉ニシテ其益甚廣ニ誠ニ不可無ノ鴻寶ナリ



醫癘三卷附錄一卷

三冊

同前

藏板

此書ハ先生ノ隨筆ニシテ神農嘗藥醫學醫科ヲヨリテ何ト云フナクテ亦  
品ナドニ至リ附錄ニハ募原屠蘇ナドノ詳攷ヲアゲ醫書古來ヨリテ疑義ヲ  
辨明シ人ノコレヲ知及サスヲ見イダシテ攷證ヲナシ醫學ヲ助ナスニ是  
先生久年ノ積トコロニシテ一時ニナルモノニアラズ又何レモ医者知ラズニナル  
ベカラザル下ニシテ無益ノコナシ世ノ好テ著述ヲナシ博ヲ貪テ雜駁ニナル  
モノト同日ニ論ベカラス誠ニ古今未曾有ル書ニシテ特リ醫學ノミナラズ凡  
學者此書ヲミバ益ヲ得ルコト少カラザルニ  
素問識 八卷 同前  
靈樞識 六卷 同前  
內經先生ノ家學ヲ此書ノ精密ナルヲ世ハノ能知ト云フ況ヤ今刻スルモハ先生  
晚年ノ定本ニ攷證詳密ヲ餘蘊アルヲ醫道ノ大本ヲ明ント欲ルモ豈此書ニ  
據ラザルベケンヤ



此書ハ四十餘部ノ注家ノ内ニタイテ其長ヲヒラビ短ヲサリ又古書ニヨリテ  
異同ヲ正シ其疑ニキ著姑ク諸説ヲ引テ敢テ臆改セズ專ラ文理確當ニシテ  
義理ニ平ヲ要トシ又古來医書ノ中ニタイテ仲景ノ義ヲ敷衍シ仲景ノ意ニ  
ヨリテ巧ナル療治ノハナシ或ハ仲景ノ方ヲ好ク活用シタル又仲景方ニ加減タル  
方又仲景ノ遺意ヲ發明シタル人其傷寒論ニアザリ治療ノ助ニナルヲハ  
毎條ニ附録メ臨證處方ノ便トス實ニ傷寒論ヲ解シ傷寒論ヲ活用ス  
ル人第ノ書ニ古來注家ト企及ベキアラザルトコロニ

脉學輯要

三卷 二冊 同前

此書ハ寸關尺三部ノ位ヨリ跌陽人迎ノ診法平人ノ脉病ノ深淺生死ヲ決  
スル法二十四脉ノ形狀婦人小兒ノ脉及ヒ八怪脉ニ至ルマデ古來脉書ノ精  
英ヲヒラビノセ又コレヲ古經ニ徵ニ實驗ニタム以テ按語ヲクハ凡脉ニノツカル  
ヲ此書ニノセザルト云フナク古來ヨリノ脉書此書ホト切正ナルハナシ實ニ医家  
第一必用ノ書ニ



廣惠濟急方 藏板

三冊 多紀藍溪先生著

此書ハ專ラ窮鄉僻壤或ハ旅中ナド医者ニ乏キ処ニテ急卒ノ病アルハ坐ニテ斃ルコトヲ憂ヘ作ラレシ書ニテ平假名ニテコレヲ書シ一二味ニテ奇効アル方ヲエラビ尤手近ナル草木蟲魚ノ禁ヲ專ラトシ其形狀ヲ図シ又縊死溺死等ハ其手術ヲエガキ又灸点ノ方モ委ク其図ヲ出シ大人小兒急ナル大病ハ言ニ及バズ諸ノ毒ニアラレ犬ノ咬ミ蟲ノサレタルナド或ハ火燒ナドマデモ如何ヤウ俗人ニテモ此書ヲミルハ其療治カタ一目ノミルベク誠ニ医者ヲ待ズメ命ヲ救ヒ苦ヲ免ルコトヲ得ルニ故ニ人々不時ノ用意ニ一部ツ所持セズバアルベカラザルノ書ニ而シテ方ハ勿論古今ノ方書ヨリエラビ出シ一々試験ノ良法ナレバ医家ト云ヒ豈ラレヲ缺ベケンヤ

傷寒論輯義

七卷 十冊 多紀襟窓先生著

古來傷寒ヲ注スルモノ多ハ古書ヲ讀カノ法医書ヲ講スル式ヲシラズ多意ヲ用テ恣ニ改竄ヲカヘ或ハ紙上ノ空談ノミニテ實用ニ益アラズ先生ノ



此書ハ傷寒發病ノ初日より五日迄又五日ヨリ十一日迄ト初メヨリ日餘ノ間ヲ分ク藥方ヲ著シ其間ニ或ハ下利後發汗後ナド色々ノ證ヲ著シ各條ノ下ニ某方ヲ著ス附録ニ山田玄珍先生ノ溫疫辨又ハ辟溫方ナド委ク出ス傷寒ノ方此書ニモルコナシ

救急選方

二冊 小本

東都醫官多紀先生輯ハル所ニ先生ノ博覽廣才世ノ知トコロニ此書古今ノ醫籍中ヨリ救急ノ奇方輯ム實ニ先生ニアラズシテ此書ヲ作ル事能ハス四方ノ医家必ズ茶菴中ニカクベカラズ

醫略抄

一冊

丹波雅忠著  
多紀樂窓先生校

此書ハ今ヲ去ルテ殆ド七百年前ノ物ニ晉唐医書卅四部ノ中ヨリノ單捷ノ方ヲアツタ急病ヲ治スルタメニ撰レタル書ニ其方ニナ奇驗ノ方ニノ且所引ノ書多クハ今ニ傳サル本ニ千金外臺ヲ讀ノ大ナル助トナリ古方ヲ講スルノ人必讀ノ書ナリ雅忠ハ日本扁鵲トイハレシ人ニ



此書ハ香川先生常ニ坐右ニ於テ驗セシ方ヲ集録ス往ニ藥選行餘  
 醫言等ノ書既ニ行ルトイハレ藥論病論ノミニテ方ヲカク令書  
 合テ全備ナリ香川家ノ四制ヨリ始メ先生ノ定方漏スコナレ  
 七池 秘錄 小本一冊 西川國華先生輯

同續編 全一冊 同作

同三編 全一冊 同作

同四編 全一冊 同作

此書ハ古今丸散ノ方ヲ集ム先大人家ニハ奇應丸一粒金丹婦人家ニ龍  
 土湯安神散小兒家ニハ萬金丹龍角圓古方家ニハ紫圓備急圓  
 類ヨリ始メ各家ヲ部類シテ且諸家經驗ノ奇方ヲ卷末ニ附ス

外科上池 秘錄 小本一冊 同作

此書ハ外科ニ用ル所ノ丸散并ニ膏藥ノ方ヲ集ム外科方書最第一ニ

傷寒方 冊小本 東都醫官 多紀法眼聞 中澤養亭作



江戸本石町十軒店萬笈堂英平吉郎藏版醫書目錄

金匱要略輯義

全十冊 大本

東都醫官桂山多紀先生歷朝諸家ノ説ヲ集メ及千金外臺等ノ書ニ引  
トヨマデノ異同ヲ考校シ且先生ノ按ヲ各條ノ下ニ附ス金匱ノ諸説ヲ書  
モルハ夏クシ實ニ註家ノ大成ニ

古方丸散方

全一冊 小本

東洞吉益先生著ス所ニ此書往年田信菴先生校正上本ス是歟マ  
東洞家ノ分量考ヲ附シ重訂補刺ス

丸散  
兼用 方機

全一冊 小本

此書ハ東洞先生作ニテ金匱傷寒ノ方ニ機變妙用アルヲ記シ東洞  
翁常用ノ方ニ臨病ノ機變コノ書ニシキタリ且丸散兼用方書ニ

一堂醫事說約

全二冊 小本



金史卷一百一十五

十一

本言錄定章



其後。濟也質性駑鈍。附驥何當。然從學日久。頗受先生之  
鞭策。仍忘僭踰。謹敘先生家學之要端。以應其命。併諗之  
同人云。

嘉永七年歲在甲寅八月望 受業江戸堀川濟撰



講。必求之古經。而講經之方。主乎攷證。其所攷證。必符實際。此讀醫經之法。卽學醫之道也。否則說理雖密。要爲無用之辨。引證雖精。多屬不急之察。蓋攷證是義理之筌蹄。實際是義理之標準。故學之得其方。能精且熟。則意必明。術必妙。以建回生起死之功。爲學之極效。不過如此耳。世之醫流。屑屑焉株守後世俗套。亂誤無算。未曾講明義理。而自謂醫之術在乎此。誑誣聖言。附會誕妄。好標新異。未曾徵之實際。而自謂醫之學盡乎此。抑亦管窺蠡測。豈足與論仲景之道耶。而又豈足以知二先生之學耶。傷寒論述義。刊行有年。今又金匱述義刻竣。先生命濟校讐。且書



仲景之書。上存三代禁方。而下垂之萬世。洵醫門真經。而濟生龜鑑也。而其文辭典雅。義理淵奧。固非淺學之所能窺測焉。自宋以來。爲之疏解者。或乃泥於卑近。或乃驚於高遠。是非紛糾。竟無一定。是櫟窻丹波先生。所以有輯義之撰也。先生之學。主乎攷證。大無不晰。細無不燭。博而約。精而詳。一以敷演經旨。裨益實際爲歸。而吾師蒞庭先生。蚤承箕業。循循乎紹贊先緒。提撕晚進。是務。凡經之一字一句。徧照諸病者。朝參夕驗。數十年如一日。一誠之所存。遂有述義之著。蓋二先生之於仲景經也。所謂金聲而玉振者矣。夫醫之學。在講明義理。施之實際。但義理不可虛



金日通義卷一  
三  
本言彙纂



金匱玉函要略述義卷下

終

余撰傷寒論述義。一以辨白全經大旨為主。今於是書特以  
其所傳具列之逐條。而各病梗概則或爲之論。以附于後。其  
體例彼此不同。而要在使學者與輯義相參攷爾。但中間有  
校譌訂訛。稍涉繁瑣者。蓋事關經義。則亦有不得已者焉。固  
非好爲泛驚遠引也。甲寅天醫節。元堅跋。

男 元琰校勘

弟子堀川濟覆審



悶吐下欲死方。煮豉汁。飲一二升。竊想葛氏所舉。本是仲

景原文。而今作食躁或躁者。係于文字譌脫。或是食菜煩

躁四字之誤也。今本肘後方。偶欠此方。然自有治諸菜毒方。而其前後諸條。概與本篇方法相同。

巢源曰。野菜芹苳之類。多有毒蟲水蛭附之。人誤食之。便

中其毒。亦能悶亂煩躁不安。可以互證。

菜中有水荳蔻。

按此云中風。卽發狂之謂。後漢書朱浮傳曰。中風狂走。

春秋二時。龍帶精入芹菜中。

按糖。卽錫字。飴弱於錫。故飴有膠飴。錫有硬錫也。輯義引釋名。用

李時珍所改。當攷原書。及方言。說文。廣韻等。



聖濟總錄曰。朽木生菌。腐土生菌。二者皆陰溼之氣蒸鬱所生也。既非沖和所產。性必有毒。若誤食之。令人吐利不已。心腹切痛。甚者身黑而死。

十一月十二月勿食薤。

鑑薤味辛散。走肺氣。食之令人多涕唾。

葵心不可食。傷人。

鑑葵心有毒。背葉反常。亦有毒。不可食。

食躁或躁方。

按金鑑所解。殆屬牽強。蓋此方介于菜類方法中。則亦當治菜毒方。攷醫心方。引葛氏方云。爲食諸菜中毒。發狂煩。



巢源曰。凡人食魚鱠者。皆是便生冷之物。食之甚利口。人多嗜之。食多則難消化。令人心腹否滿。煩亂不安。

神巧萬全方。治食物過飽不消。遂成痞膈將死方。

馬牙消

一大兩。碎之。如無。以朴消代之。

吳茱萸

半斤。陳者。

右煎茱萸取

濃汁。投滓承熱服之。久未轉。更進一服。立愈。唐竇羣嘗話。在常州時。食膾不消。痞結悶甚。諸藥悉不轉。腹堅氣絕。醫

徐彥莊處得此方。服乃瘥。竇云。微此殆絕。

○果實菜穀禁忌并治第二十五

按此篇合八十法。方十八首。今不言者。蓋脫文也。

食諸菌中毒。悶亂欲死方。



胃中惡血。知此方亦取涌吐。

治黍米中藏乾脯食之中毒方。

**程**大豆能解諸毒。故用以治。

治六畜鳥獸肝中毒方。

按六上似脫食字。

治食犬肉不消。

按心急字疑本草引梅師方作忽字。

巢源曰凡狗肉性甚躁熱其疫死及狂死者皆有毒食之

難消。故令人煩毒悶亂。

鷄有六翮四距者。

先兄曰爾雅羽本謂之翮。說文翮羽莖也。

鱠食之在心胸間不化。



疫死牛肉。食之令病洞下。

巢源食牛肉中毒候曰。又因疫病而死者。亦有毒。食此牛肉。則令人心悶身體癢。甚者乃吐逆下利。腹痛不可堪。因而致者非一也。

治自死六畜肉中毒方。

**程**六畜自死。必因毒疫。苦能解毒。黃蘗。味之苦者。

治食鬱肉漏脯中毒方。

按犬屎。本草唐本注云。白狗屎。主丁瘡。水絞汁服。主諸毒不可入口者。人乳。功見下條。生韭汁。本草引孟詵云。宵癰。心中急痛如錐刺。取生韭。或根。五斤。先搗汁。灌少許。即吐。



巢源曰。凡禽獸六畜自死者。肝皆有毒。不可食。往往傷人。其疫死者彌甚。被其毒者。多洞利嘔吐。而煩悶不安。

猪肉不浮者。不可食。  
按據前後條猪字當作諸字。

自死肉口閉者。不可食之。

巢源曰。凡可食之肉。無甚有毒。自死者。多因疫氣所斃。其肉則有毒。若食此毒肉。便令人困悶。吐利無度。是中毒。

六畜自死。皆疫死。

巢源曰。六畜者。謂牛馬猪羊鷄狗也。凡此等肉。本無毒。不害人。其自死。及著疫死者。皆有毒。中此毒者。亦令人心煩悶。而吐利無度。



肝病禁辛。心病禁鹹。

醫說引食治通說云。金匱要略方曰。春不食肝。夏不食心。秋不食肺。冬不食腎。四季不食脾。謂畜獸五臟。能益人五臟。春時木旺。肝氣盛。脾氣敗。故不食肝。食之則肝氣愈盛。脾氣愈敗。因成脾病。則難治也。或春月肝經受病。明有虛證。亦宜食肝以補之。或春月肝氣太盛。即宜食肺以抑之。又云。肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。肺病禁苦。腎病禁甘。五味遞相剋制。故禁之也。或肝氣太盛。因而生病。亦宜辛味以制之。更在心智變通。不可全執定論。他臟倣此。

凡肝藏自不可輕噉。

自字疑衍。



張仲景云。半夏湯。治散發。干歐不食飲方。

半夏八兩

洗炮

生薑十兩 桂心三兩 橘皮三兩 右四物。以水七升。

煮取三升半。分三服。一日令盡。

張仲景方。治寒食散。大小行難方。香豉二升 大麻子

一升破 右二物。以水四升。煮取二升八合。去滓停冷。一

服六合。日三。

○禽獸魚蟲禁忌并治第二十四

論辨二首

合九十法

按當八十六法

方二十一首

按當二十首

凡飲食滋味。以養於生。

按服藥煉液。言道家辟穀之流。



千金曰。但埋死人煖灰中。頭足俱沒。惟開七孔。

治馬墜。及一切筋骨損方。

**鑑**外浴以散其瘀。內服以下其瘀。斯得之矣。

按醫心方。服石方中。引張仲景者。凡四道。未知本經之遺否。姑附載于左。

張仲景云。解散發。煩悶欲吐不得。單服甘草湯。甘草五

兩。<sup>切</sup>以水五升。煮取二升。服一升。得吐即止。

張仲景方云。黃芩湯。治散發腹內切痛方。支子二兩

香豉三升。黃芩二兩。凡三物。<sup>切</sup>綿裹。以水九升。煮取

三升。分三服。以衣覆卧。必應有汗。



又治暴癰。氣攻心腹脹痛。不欲飲食。宜服巴豆圓方。

於本方加木香蓬莪茂。

又治卒死及感忤。口噤不開者。宜服此方。

即本方以棗瓢和圓如棗豆大。以溫水下。

聖濟治小兒木舌。腫脹滿塞口中。三物備急丸方。

即本方如棗豆大。每服五丸。溫水下。大便利為度。

尸蹙。脈動而無氣。靜而死。肘後作靜然而死。外臺同而作如而字。當為如義讀。

按尸蹙。即陽氣暴實。凌轢陰血之病。蓋中氣之類也。說詳

于扁倉傳彙攷中。當參。

救溺死方。



按徐氏曰。此方妙在乾薑巴黃。峻利寒熱俱行。有乾薑以守中。則命蒂常存。且以通神明。而復正性。故能治一切中惡卒死耳。程氏曰。大黃蕩滌腸胃。乾薑溫中散寒。巴豆除邪殺鬼。故主如上諸證。愚意二說俱非。蓋此方所主。其證極暴極實。僅有顧慮。禍速反掌。是以其治要在短刀直入。咄嗟奏凱。故巴豆辛熱峻下。以爲之君。大黃爲臣。以輔峻下之用。乾薑爲佐。以助辛熱之性。三味相藉。其功益烈。爲攻瀉諸方之冠。所以能相抵當也。

聖惠治惡症心腹痛。如錐刀所刺。脹滿欲死者。消石圓下於本方。加消石。附子。



按藥以貼稱。宋以上所罕見。

說見于先教論撰醫牘中。

藥滓再煮。見陶

氏本草序例。然僅係于諸補湯所用。

### 長服訶黎勒丸方

本草圖經引張仲景云。長服方。訶黎勒。陳橘皮。厚朴。各三

大兩。搗篩。蜜丸。大如梧子。每服二十丸。至三十丸。

### 三物備急丸方

千金三味各等分。曰。右皆須精新。多少隨意。先

合搗千杵。即爾用之。為散亦好。下蜜為丸。貯密器中。莫令歇氣。本草圖經引。作用大黃。乾薑。巴豆各一兩。須精新好者。搗篩。蜜和。更搗一千杵。丸如小豆。服三丸。老少斟酌量之。為散不  
及丸也。云云。无服大豆許三四丸七字。按据千金方後用字  
句亦佳二字。當在蜜和丸上。蓋言  
即爾以散為便。久貯蜜丸為佳。

雷公炮炙論云。云如大豆許者。取重十兩鯉魚目比之。



四肢麻木作戰。不知飢餓。右脈洪大如菀豆。以川芎。香附。麥芽。山查。烏梅。粉草。桔梗。酒芩。防風。荊芥。白朮。茯苓。四劑而安。次月經水大行。十日不止。以黃耆。阿膠。蒲黃。各一錢。白芍藥二錢。粉草三分。一帖而止。此後但覺濁氣下墜。屁從子戶中出。以補中益氣湯。加酒炒黃連。調養而平。

小兒疳虫蝕齒方

幼幼新書引。葶藶下。有各少許三字。臘日。作臘月。鎔上。有和字。趙注本。不載此方。

魏附小兒疳虫蝕齒一方。不知何意載于篇末。或有兒科之書。闕略不全。掛一漏百者乎。

○雜療方第二十三

按以下三篇。二注本。及朱氏亦不載。

柴胡飲子方



注荀子脩身篇擊戾云猶了戾也

少陰脈滑而數者陰中即生瘡

脈經分爲二條又曰少陰脈數則氣淋陰中則生瘡

平脈法曰少陰脈微滑滑者緊之浮名也此爲陰實其人必股內汗出陰下溼也

胃氣下泄陰吹而正喧

脈經此條前有一條曰少陰脈弱而微微則少血弱則生風微弱相搏陰中惡寒胃氣下泄吹而正喧

婦人良方膏髮煎治婦人穀氣實胃氣下泄陰吹而正喧陰中出血

赤水玄珠曰令媳長卿之婦腹中微疼經行不流行喉痛



問曰婦人病飲食如故。

按此條之證。本是下焦壅滯。不得溺利者。膀胱爲之急脹。而胞系遂至繚戾。溺隨益閉。以致煩熱不得卧。而反倚息。故用腎氣丸。開其壅滯。利其小便。則膀胱寬豁。而其系復舊也。此證不必下元衰乏。而其用此丸者。專取之利水。故云但利小便則愈。

又按慧琳一切經音義。繚戾。考聲云。戾猶結紐也。亦繚戾。紛紜貌也。云云。徐氏曰。了戾者。其系紐轉也。先兄曰。盧文弨鍾山札記云。了戾者。屈曲旋轉之意。許慎注淮南原道訓云。捻。了戾也。郭璞注方言三。軫。戾也。云相了戾也。楊倞



竝以爲阿膠乾薑二味俱難從。

婦人六十二種風。

按趙氏以爲六十二種風。盡以一藥治之。明其非仲景法。然原其立方之旨。破血通經。用紅花酒。則血開氣行。而風亦散矣。

紅藍花酒方

本草圖經曰。張仲景治六十二種風。兼腹內血氣刺痛。用紅花一大兩。分爲四分。以酒一大升煎強半。頓服之。不止再服。又一方。用紅藍子一升。擣碎。以無灰酒一大升八合。拌了。暴令乾。重擣。蜜丸如桐子大。空腹酒下十丸。



土瓜根者。能通月水。消瘀血。生津液。津生則化血也。芍藥主邪氣腹痛。除血痺。開陰寒。桂枝通血脈。引陽氣。蠱蟲破血積。以消行之。

按趙注明備。本綱意補或字。蓋仍之也。又千金方溫經湯主婦人小腹痛。用茯苓芍藥土瓜人薏苡人。其旨相似。寸口脈弦而大。

按尤氏說三品功用。本于趙氏。趙又曰。凡系帛皆理血。血色紅。用絳尤切於活血。

婦人陷經漏下。

按趙氏曰。方雖不全見。膠艾二物亦足以治之。沈氏魏氏。



溫經湯方

按此方半夏其旨難晰。程氏謂以止帶下。殊屬無稽。徐氏曰。下利已久。脾氣有傷。故以薑半正脾氣。亦未覈。

楊氏家藏方。調經湯。治衝任脈虛。風寒客搏。氣結凝滯。每經候將行。臍腹先作撮痛。或小腹急痛。攻注腰脚疼重。經欲行時。預前五日。及經斷後五日。並宜服之。

於本方去阿膠。加五加皮。熟乾地黄。烏藥。紅花。沒藥。帶下經水不利。少腹滿痛。

徐帶下。卽前所謂此皆帶下。非專指赤白帶也。趙此亦因瘀血而病者。經水卽不利。一月再見之不同。皆衝任瘀血之病。



先兄曰癰當作痿字之誤也。蓋上焦寒凝無為肺癰之理。

肺冷為痿。甘草乾薑湯證是也。

脈經婦人病亦有效。逆嘔沫其肺成痿語。魏又

曰。繞臍隱伏為少腹冷痛。為奔豚。為寒疝。種種不同。傷出

者結于兩脇。如臟腑相連。邪高痛下。而痛反在關元。為下

厥上逆之證。沈氏以未多為未經多日之義。非是。徐氏曰。

奄忽四句為一段。宜從。蓋奄字上當存或字看。金鑑以為

痛甚之常狀。似非。厥癰即癰疾。脈要精微論曰。厥成為顛

疾。又曰。來疾去徐。上實下虛。為厥顛疾。是也。嘔吐涎唾。涎

字韻。下根氣街。根字韻。古書句中有韻。韻未必在句尾。見

錢大昕十駕齋養新錄。王引之經義述聞。

輯義引巢源不通二字。刺。



按徐氏曰。婦人之病。至胞門。爲一篇綱領。因虛積冷。結氣  
六字。尤爲綱中之綱。謂人不虛。則邪不能乘之。因虛故偶  
感之冷。不化而積。氣熱則行。冷則凝。冷氣凝滯。久則結。結  
者。不散也。血遇冷氣而不行。則經水斷絕。然有微甚上下  
不同。故曰諸。程氏曰。此條當分作三截看。婦人之病。必因  
於虛勞。因於積冷。因於結氣。卽結熱三者皆能爲婦人諸經  
作病。尤氏義同程氏。而金鑑亦仍之。今熟玩經文。徐說似  
長。但其解諸字恐非。魏氏曰。諸。卽之也。爲安。蓋此條以血  
寒積結下焦爲主。自寒傷經絡。至非止女身十五句。是客  
詞。係于舉上焦中焦之病。以備下焦之參照者。久成肺癰。



外臺廣濟療心腹脹滿柴胡厚朴湯方。

於本方去半夏加柴胡橘皮檳榔。

聖惠治膈氣胃中妨悶痰壅不下食紫蘇散方。

於本方加枳殼柴胡檳榔桂心。

又治心腹脹滿痰飲不下食厚朴散方。

於本方加陳橘皮前胡檳榔。

婦人藏躁喜悲傷欲哭。躁脈經趙徐沈尤朱注本並作燥誤

婦人吐涎沫醫反下之心下即痞。

按據小青龍湯攷之則此所謂涎沫亦即稠痰耳。

婦人之病因虛積冷結氣。未多之未朱曰疑是寒字誤未勻原本諸本並作不勻宜改



傷寒論述義中。茲不復贅。捏注。至治有殊也。全取傷寒蘊要。

婦人咽中如有炙轆。

焦循雕菰集。羅浩醫經餘論序曰。其論金匱。以水症氣衝咽。狀如炙肉證。婦人咽中有炙轆。為有形之邪。阻無形之氣。

按梅核氣之名。昉見直指方。前人或謂為噎膈之漸。蓋在男子。往往馴為噎證。女子則多不過一時氣壅痰結也。

半夏厚朴湯方

醫心方。醫門方。療咽中如肉轆。嚥不入吐不出方。

於本方。去蘇葉。加橘皮。



極猶用白頭翁湯。其加甘草阿膠者。不啻補血益氣兼爲緩中調腸之用。陶氏云。甘草通經解毒。東垣云。熱藥得之緩其熱。寒藥得之緩其寒。甄氏云。阿膠止痢。楊仁齋云。痢疾多因傷暑伏熱而成。阿膠乃大腸之要藥。有熱氣留滯者。則能疎導。無留滯者。則能平安。據此諸說。則增加之意可知。虛閉竝用阿膠。乃是此意。此說精確。

○婦人雜病脈證并治第二十二

論一首

脈證合十四條

按當作十條

方十四首

按當十三首

婦人中風七八日。續來寒熱。

按經水適斷四字。宜爲七八日上看。蓋篇首四條。既詳于



對待爲辨也。又膀胱猶言下焦。不須深講。

產後中風發熱面正赤。

徐中風發熱頭痛表邪也。然而正赤。此非小可。淡紅所謂面若粧朱。乃真陽上浮也。加之以喘。氣高不下也。明是產後太虛。元氣不能自固。而又雜以表邪。自宜攻補兼施。

產後下利虛極。

徐凡治痢者。溼熱非苦寒不除。故類聚四味之苦寒不爲過。若和血安中。只一味甘草及阿膠而有餘。治痢好用參朮者。政由未悉此理耳。

按虛極猶言疲憊。軒邨寧熙曰。此證本自熱利。故雖至虛。



耆湯方。

於本方加黃耆。白朮。甘草。人參。

下瘀血湯方

趙與抵當同類。但少緩爾。

按此方。猶是抵當丸大陷胃丸之例。宜云下瘀血丸。今作

湯字者。蓋傳寫之譌耳。方後煎字。亦宜作煮字。始合古義。

產後七八日。無太陽證。脈經。更無切脈二字。再倍下。有其人二字。不食。作不能食。

按此條。李注極允。且據無太陽證一句攷之。則其有裏證。

可以推知。蓋是產後得邪。邪氣下陷。與血相搏者。既有熱

候。亦有少腹堅痛。與產後得胃家實者。其證相似易錯。故



屬實矣。是宜大承氣以下裏。此其意稍異。存攷。

產後腹中疝痛。

千金。治產後虛羸喘乏。白汗出。腹中絞痛。羊肉湯方。

於本方。加桂心。芍藥。甘草。芎藭。乾地黄。

聖惠。羊肉。地黄。湯。更加人參。

外臺。許仁則。產後更無他狀。但覺虛弱。欲得補氣力。兼腹痛。宜羊肉當歸湯方。

於本方。

當歸五兩。生薑六兩。

加黃耆四兩。若覺惡露下不盡。加桂

心三兩。惡露下多。覺有風。加芎藭三兩。覺有氣。加細辛

二兩。覺有冷。加吳茱萸一兩。覺有熱。加生地黄汁二合。

聖濟。治產後血氣不利。心腹急痛。上下攻衝。氣逆煩悶。黃



白薇湯。白薇。當歸。各一兩。人參半兩。甘草一分。炙。水煎服。

倉公散。瓜蒂。藜蘆。雄黃。礬石。煨。等分。少許吹入鼻中。按二方並

非本條證所宜姑附之

又曰。婦人產後有三種疾。鬱冒則多汗。多汗則大便秘。故

難於用藥。唯麻子蘇子粥。最佳且穩。按冒家汗出乃復後但腸燥便秘者此粥

為佳首條所謂大便秘者亦或所宜

病解能食。七八日更發熱者。

按此條證。徐朱以為食復。魏周意亦然。蓋沈氏與此諸家

俱就能食而立說。但尤氏曰。病解能食。謂鬱冒解而能受

食也。至七八日更發熱。此其病不在表而在裏。不屬虛而



四句。釋前條亡血復汗之理。卽血虛邪客之候。陰陽乃復一句。與冒家欲解。必大汗出相應。蓋喜汗出。頭汗。大汗。三證不同。宜分別看。

又按大便反堅。反字。對嘔不能食而言。蓋嘔不能食。是少陽證。大便宜未至堅。今產後液燥。故大便反堅也。

本事方曰。人平居無苦疾。忽如死人。身不動搖。默默不知人。目閉不能開。口噤不能言。或微知人。惡聞人聲。但如眩冒。移時方寤。此由已汗過多。血少氣併於血。陽獨上而不下。氣壅塞而不行。故身如死。氣過血還。陰陽復通。故移時方寤。名曰鬱冒。亦名血厥。婦人多有之。宜白薇湯。倉公散。



又按巢源婦人雜病中曰。張仲景云。婦人經水過多。亡津液者。亦大便秘難也。恐係于錯引本條者。

產婦鬱冒。其脈微弱。

大便秘堅。嘔不能食。七字。脈經作所以便秘者。嘔不能食也。

先兄曰。明理論云。鬱為鬱結而氣不舒也。冒為昏冒而神不明也。世謂之昏迷者。是也。此條不言發熱。然後條有發熱之語。則其有熱者可知。即為草薺傷風明矣。

按此條文法。稍近倒裝。小柴胡湯主之一句。本當在但頭汗出下。其以先辨鬱冒之理。故更於章末補出三句也。冒家大汗出。即是小柴胡相適之效。亦猶少陽病振汗之比。且以血虛下厥三句。釋頭汗出之理。所以產婦喜汗出者。



辛俱取其辛溫通氣散膈上寒飲也。

按千金治欬嗽胸脇支滿多唾上氣方酒一升半浸肥皂  
莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如藥法若吐多以  
酢飯三四口止之此方嘔用醋漿其義一也。

○婦人產後病脈證治第二十一

論一首

證六條

按當五條

方八首

問曰新產婦人有三病。

按產後瘕病其證治與上經所敘無別故更不論列鬱冒  
開在次條但大便難則不出其方然不出于脾約丸等潤  
燥手段也。



本草序例。雷公炮炙論。云如小豆許者。取重八兩。鯉魚目比之。

葵子茯苓散方

朱葵子通利諸竅。稱能滑胎。其疏泄血分可知。而得茯苓之淡滲功。耑氣分者。爲之佐。使水從氣分而去。則胎自無虞。

按冬葵子。本草白字曰。主五癰。利小便。黑字曰。療婦人乳難內閉。

白朮散方

先兄曰。千金半夏湯。治腳氣上入腹。方中用細辛。與此治心煩吐痛者同趣。又范汪旋覆花湯。治胸膈痰結。亦用細



按張氏醫通全取趙氏。

乾薑人參半夏丸方

醫心方。僧深方。治婦人任身惡阻。酢心。胃中冷腹痛。不能

飲食。輒吐青黃汁方。用人參 干薑 半夏 凡三物

分等。治下。以地黃汁和。丸如梧子。一服三丸。日三。今案

極要方云。各分稍加至十丸。產經云。人參丸神良。

幼幼新書。嬰孺。治小兒。調中止痢。去冷進食。人參丸方。

於本方。加茯苓。蜜丸。

當歸貝母苦參丸方

按張氏醫通。本于趙氏。



先兄曰。說文有疝無疝云。疝腹中急也。从疝斗聲。

當歸芍藥散方

朱芎歸芍藥。足以和血舒肝。苓朮澤瀉。足以運脾勝溼。此卽後人逍遙散之藍本也。

按妊娠之常。飲水動易停滯。是以內寒腹痛。此方利水散

寒。以使胎氣盛實。芎歸二味。不特養血。亦能散寒止痛。古

方往往見之。此方所用。或此意也。抱朴子至理篇曰。當歸芍藥之止絞痛。先

兄亦曰。此方芍藥多用。取之緩其痛。與小建中之芍藥同

趣。趙說似迂曲。

妊娠嘔吐不止。

又治妊娠胎動有所下血。腹脇疼痛。宜服阿膠散方。

於本方去芍藥。加赤石脂。龍骨。黃耆。乾薑。不用酒。

衛生家寶。丁香膠艾湯。治崩漏走下不止。

於本方加丁香末四分。

蘭室祕藏。丁香膠艾湯。治崩漏不止。蓋心氣不足。勞役及

飲食不節。所謂經漏少時。其脈二尺俱弦緊洪。按之無力。

其證自覺臍下如冰。求厚衣被。以禦其寒。白帶白滑之物。

多。間有如屋漏水下。時有鮮血。右尺脈時微洪也。

於本方去甘草。加丁香。

婦人懷娠。腹中疴痛。



飲食不下。氣上煩滿。四支痺疆。當歸湯方。

於本方。去芍藥。加生薑。橘皮。

千金翼。當歸湯。治產後血留。下焦不去。

於本方。去阿膠。艾葉。加桂枝。

聖惠。治產後下痢。腹中疝痛。當歸散方。

於本方。去阿膠。加乾薑。

聖濟。治妊娠因驚。胎動不安。當歸湯方。

於本方。加人參。不用清酒。

又治妊娠卒下血。致胎不安。少腹疼痛。人參湯方。

於本方。去芍藥。加人參。黃芩。吳茱萸。生薑。不用清酒。

三證併列。以備參對也。鑑程剖析不了。朱氏爲是。但芎歸

膠艾湯。則足以兼三證而治之矣。

程氏引脈經。攷原書作今陽不足。故令激經也。

又按魏氏曰。假令妊娠而下血。腹中痛。此胞氣阻滯之故也。胎氣何以阻。以氣虛寒也。氣虛寒。則血必不足而凝。凝則氣愈阻而作痛。氣阻血凝。則又内生虛熱。血之凝者尚凝。而餘血遂漏不止。甚則傷胎而動。動而竟墜。此胞中氣血。因虛而寒。因寒而阻。因阻而凝。因阻凝而熱。因熱而下血。因下血而傷胎墜孕。遞及之道也。此說太巧。姑存之。

芎歸膠艾湯方

醫心方。產經云。治任身七八月。腰腹痛。胎不安。汗出逆冷。



按此方茯苓亦是引藥下導者。

說見于虛勞腎氣丸下。

芍藥取之通

壅。

宜參傷寒論述義太陰病下。

此五味之所以相配也。

又按玄珠經通真丸婦人通經男子破血用大黃桃仁天

水末。

一名益元散。

乾漆杜牛膝。

醫學綱目四卷中引。

正得此方之意。

婦人懷娠六七月脈弦發熱。

按惡寒尤氏為腹惡寒然猶似身惡寒存攷。

師曰婦人有漏下者。

朱婦人下血大概由于衝任二經為病或無端漏下或半產

後下血或妊娠下血下血雖異而源頭則一。

按此條漏下與半產後下血是客妊娠下血腹中痛是主。

金匱玉函要略述義卷下

丹波元堅 學

○婦人妊娠病脈證并治第二十

證三條

按當作二條

方九首

婦人宿有癥病。

脈經首五句作婦人妊娠經斷三月而得漏下。下血四十日不止。胎欲動在於臍上。此而妊娠

三十字。血不止。作下血不止。

按瘀血癥瘕。必在臍下。妊娠二三月墮者。多其所害。此云

在臍上者。竊不無疑。或是譌字。敢俟有識論定。

脈經胎在臍上。更疑。

桂枝茯苓丸方

朱服法甚緩。以深固之邪。止堪漸以磨之也。



（The main body of the page contains multiple vertical columns of text, which are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into approximately 10-12 columns, typical of traditional Chinese medical texts like the Golden Chamber Formulas.)

以微溫浴了。卽以帛微裹。然傳灰囊之甚良。政和本之作上。此方

可疑。然以託名仲景。姑附于斯。

問曰。病腹痛有蟲。巢源若作弱蓋論。

甘草粉蜜湯方

伊澤信恬曰。外臺天行。備急。療勞復方。以粉三升。以煖飲和服。又以水和胡粉少許。服之亦佳。据此。則粉與胡粉。自別可知。

金匱玉函要略述義卷中 終



雞屎白散方

本草圖經引方寸匕上有量字

陰狐疝氣者

本草圖經引者字在上下字下

四時刺逆從論曰厥陰滑則病狐疝風。楊上善云狐夜不

得尿日出方得人之所病與狐同故曰狐疝。一曰狐疝謂

三焦孤府為疝故曰孤疝。五色篇曰狐疝瘻疝之屬也。

蜘蛛散方

圖經引作二物為散每服八分一匕日再蜜丸亦通政和本一字不複

小島尚質曰八分一匕謂十分方寸匕之八。

幼幼新書嬰孺治少小偏癰方

右以蜘蛛一箇燒灰作末飲服之愈。

按本草無食子條引海藥云張仲景使治陰汗取燒灰先

浸淫瘡黃連粉主之。

醫心方。極要方。療身上瘡。瘡汁所著處。卽成瘡。名曰浸淫。痒不止方。黃連一兩。黃蘗一兩。蘆茹一兩。

礬石一兩。甘草一兩。生胡粉一兩。

右搗甘草已上爲散。胡粉於鎗子中著。熬令黃。和之爲散。欲傅藥。先以苦參汁以洗。故帛拭乾。卽著藥。不過三四度。卽差。

○跌蹠手指臂腫轉筋陰狐疝蛇蟲病脈證治第十九

魏氏曰。仲景敘男子雜症。因收羅細碎。諸篇未及者。歷

言之。



又按方後所謂有膿者其膿稍萌之義與前條之全就腐潰者不同矣。

聖濟梅人湯治腸癰裏急隱痛大便祕澀。

於本方以梅核人代桃仁用冬瓜人加犀角。

按奇效梅仁散原方。

問曰寸口脈浮微而澀。

鑑脈微氣奪也。脈濡血奪也。故曰法當亡血汗出也。設無亡血汗出等病則必身有瘡被刀斧所傷亡血也。

按不汗者一句。空云設不亡血若汗出者。今特舉不汗而不云不亡血者。蓋省文也。金鑑爲是。又瘡古作創。卽金瘡之義也。其从疒者。係于六朝俗字。

辨者。殆失之迂矣。

又按三因方。舉此條云。久積陰冷所成也。故金匱用附子溫之。舉次條云。此以內結熱所成也。故金匱用大黃利之。亦不可從。

大黃牡丹湯方

兒琰曰。上條。空從巢源刪去。小便自調四字。而如淋上補。小便數三字。於理始順。

按癰腫之病。不論外內諸證。其初起也。乘其未潰而奪之。其既成也。扶正氣以外托。故葶藶大棗瀉肺湯。肺癰逐毒之治也。桔梗湯。肺癰排膿之治也。大黃牡丹湯。腸癰逐毒之治也。薏苡附子敗醬散。腸癰排膿之治也。蓋瘍醫之方。皆莫不自此二端變化。亦卽仲景之法則也。



外臺黃芩湯。

按此黃連湯類方。亦治上熱下寒。以爲乾嘔下利也。

醫心方。范汪方。治傷寒五六日。嘔而利者。黃芩湯。

即本方。

○瘡癰腸癰浸淫病脈證并治第十八

脈經題曰癰腫腸癰。金瘡浸淫脈證。似是。

腸癰之爲病。其身甲錯。

本草圖經引云。張仲景治腹癰。腹有膿者。薏苡仁附子敗醬湯。

按次條。其癰未至膿潰。故少腹腫痞。此條既經膿潰。故按

之濡如腫狀。腹無積聚。次條血猶瘀結。營鬱而衛阻。故時

時發熱。復惡寒。病猶屬實。故其脈遲緊。此條營分既無所

鬱。故身無熱。膿成則血燥。故脈數。要之此二條。其別在膿

已成與未成之分。而不拘其部位。如前注家。以大小腸爲

然逐條尋究判然而明矣。抑更有一義。蓋濡瀉滑泄。固宜溫固。然有內有宿積。而治宜疎刷者。腸澼瘳下。固宜疎刷。然有陽虛氣陷。而治宜溫固者。然則學者宜審其脈證。而處其方劑。不須特以腸澼泄瀉為分別。仲景之合為一篇者。意或在于此歟。五十七難。大瘕泄者。裏急後重。數至圉而不能便。莖中痛。亦即滯下。而居五泄之二。其意與仲景一也。

附方

千金翼小承氣湯。

沈此燥屎內結。大便不通壅逆。胃邪上行。而噦數譫語。所以亦宜輕利和中。而滌熱開結也。



上好者。兩枚炮取皮。一枚生取皮。同末之。以沸漿水一兩  
合服之。淡水亦得。若空水痢。加一錢匕甘草末。若微有膿  
血。加二匕。若血多。加三七。皆效。

本草衍義曰。訶梨勒。氣虛人。亦宜緩緩煨熟少服。此物雖

澀腸。而又泄氣。蓋其味苦澀。

按程氏所引。文不同。又程氏引杜士方。本出本草黃連條。

云杜士治氣痢瀉裏急後重。云用黃連乾薑二味。又引劉禹錫傳信方。亦是本草所引。

餘述朱丹溪曰。仲景治痢。可溫者溫。可下者下。或解表。或

利小便。或待其自己。區別易治難治不治之證。至為詳密。

然猶與滯下袞同。立方命論。

出局方發揮。

蓋腸澼滯下。與濡瀉

滑洩。其證與治。本自不同。仲景一以下利命之。併而為篇。

陰陽不同。舉此二者爲例。六經皆得結而爲利。各有陰陽也。  
訶梨勒有通有澀。通以下涎消宿食。破結氣。澀以固腸脫。佐  
以粥飲。引腸胃。要補虛也。

聖惠方曰。夫氣痢者。由表裏不足。腸胃虛弱。積冷之氣。客  
於腸間。藏腑不和。因虛則洩。故爲氣痢也。

### 訶梨勒散方

本草圖經云。訶梨勒主痢。本經不載。張仲景治氣痢。以訶  
梨勒十枚。麪裹焙。灰火中煨之。令麪黃熟。去核。細研爲末。  
和粥飲頓服。云唐劉禹錫傳信方云。予曾苦赤白下。諸藥  
服遍。久不差。轉爲白膿。令狐將軍傳此法。用訶梨勒三枚。



虛也。以强下之故也。設脈浮革。因爾腸鳴。當溫之。

病可溫證中亦

有此條。有宜當歸四逆湯字。曰。夫風寒下。疑脫。利字者。不可下。又傷寒論不可下篇。有此條。

之下之後。心下堅痛。脈遲者。為寒。當溫之。脈沈緊。下之亦

然。脈大浮弦。下之當已。又病可溫證曰。下利飲食者。就溫

之。又曰。下利脈遲緊。為痛未欲止。當溫之。得冷者。滿而便

腸垢。此條千金載在下利中。千金痢門。稍與脈經同。更有一條。曰。下

利大孔痛者。當溫暖之。

紫參湯方

本草圖經引甘草二兩。一升半。作半升。

氣利。訶梨勒散主之。

趙治病有輕重。前言氣利惟通小便。此乃通大便。蓋氣結處。

下利已差。至其年月日時復發者。

按朱氏曰。因初病利時。漫用藥止住。而病根不拔。舊于此時受邪者。臟氣卽應時相感。而復病焉。此說不必。

又按傷寒續論曰。此條世本尚有宜大承氣湯五字。衍文也。故去之。詳未盡之邪。可以畱伏經年而發。必係寒邪。寒邪惟可備急丸溫下。不應大承氣寒下也。設屬熱邪。必無經年久伏之理。此說拘執。不可從。

又按脈經下利篇所載諸條。出于本經之外者。今錄于左。曰。脈滑按之虛絕者。其人必下利。曰。下利而腹痛滿者。爲寒實。當下之。曰。下利腹中堅者。當下之。曰。下利脈浮大者。



功矣。雖有盧扁。將安施乎。此說信然。

下利。脈數而渴者。今自愈。

按邪熱逼血。血滲入於腸。故清膿血。魏氏曰。熱且蓄停腸。脫。釀為污穢。膿血隨利而下。此亦理之所有也。

下利清穀。不可攻其表。

脈經。脈滿下。有其藏寒者。當下之。七字。

下利。脈遲而滑者。實也。

成氏曰。經曰。脈遲者。食乾物得之。

按此語未詳所出。當改。

金匱要略

曰。滑則穀氣實。下利脈遲而滑者。胃有宿食也。脾胃傷食。

不消水穀。是致下利者。為內實。若但以溫中厚腸之藥。利

必不止。可與大承氣湯。下去宿食。利自止矣。

壅。除此之外。凡十一方。雖有兼涼兼溫之殊。大要皆不出于驅飲逐水。則知其係于水飲所致者爲多。蓋胃喜燥而惡溼。故水飲停滯。其氣易逆也。虵之爲物。最能使嘔。敘在次篇。噦。啻舉氣逆證。然黃疸篇。有小半夏湯之法。則亦有自停飲者。可以推知。而其要有數因。前人辨之盡矣。

夫六府氣絕於外者。

按金鑑曰。氣絕。非謂脫絕。乃謂虛絕也。朱氏曰。按氣絕兩字。當作病氣隔絕論。若真陰陽氣絕。豈止手足寒與不仁哉。二說並存攷。程氏又曰。不禁則上無脹悶。中無痛楚。下無奔迫。但孔如竹筒。漫無約束。直流不休。訶子栗殼。咸無



於本方去大棗加茯苓。枇杷葉。麥門冬。半夏。

衛生家寶。人參竹茹湯。治一切吃逆。及治傷寒中暑等吐。

於本方去大棗加半夏。

活人事證方後集。橘皮湯。治中暑痰逆惡寒。即本方

傷寒蘊要。橘皮竹茹湯。治胃中壅熱而噦嘔者。

於本方去參。薑。棗。加半夏。茯苓。黃連。葛根。

傷寒大白。人參橘皮竹茹湯。治胃虛呃逆。

於本方去大棗。加厚朴。半夏。藿香。

餘述嘔吐之證。其因不一。今細檢經方。吳茱萸湯之嘔與

乾嘔。因陰逆。四逆湯之嘔。因陽敗。大黃甘草湯之吐。因食

橘皮湯方

十僂良方。指迷。橘皮甘草湯。治若身大熱。背微惡寒。心中煩悶。時時欲嘔。渴不能飲。頭目昏痛。惡見日光。遇涼稍清。起居如故。此由飲食失宜。胃中空虛。熱留胃口。其脈虛大。而數。謂之中暑。

於本方加甘草。

橘皮竹茹湯方

千金翼。竹茹湯。主噦方。

於本方。去人參。大棗。加半夏。紫蘇。

三因。橘皮竹茹湯。治胃熱多渴。嘔噦不食。



於本方。

各半兩。

加白礬。

一兩。

燒灰爲末。

以生薑汁煮麴糊和圓。

如梧桐子大。每服不計時候。以薑棗湯下二十圓。

生薑半夏湯方

按此湯一升分四服。殊與常例不同。傷寒蘊要曰。凡嘔而  
不止者。服藥宜徐徐呷下。不可急也。蓋其義也。

乾嘔噦。若手足厥者。

按乾嘔與噦。自是二證。蓋言乾嘔若噦也。魏氏曰。爲病之  
淺者言之也。若夫病之深。陽氣微弱之甚者。則非四逆不  
足以取效也。或者先用此。以順行其氣。而後與以四逆。亦  
次第淺深之治也。此說失當。

按此條病輕藥重。殊不相適。柯氏以此湯移置于太陽下  
篇文蛤散條。仍攷此條。乃是文蛤散證。彼此相錯也。消渴  
篇曰。渴欲飲水不止者。文蛤散主之。可以互徵矣。但兼主  
微風脈緊頭痛一句。卽湯方所主也。

半夏乾薑散方

按半夏散不能散服者。水煮。此方漿水服。俱是取于不戟  
咽乎。後世有煮散法。其理自異。

聖惠治冷痰飲。胃膈氣滿。吐逆不思飲食方。

於本方加丁香。以生薑粥飲。調下一錢。半夏二兩。餘並一兩。

又治痰逆。暖胃口。惡飲食方。



外臺集驗。茯苓小澤瀉湯。

按醫心方引經心方名茯苓湯。

聖濟。治胃反吐逆。發渴飲水。茯苓飲方。

於本方。去生薑。加乾薑。

又治心脾壅滯。暴渴引飲。茯苓飲方。

於本方。去生薑。加黃連。大黃。小麥。

宣明。桂苓白朮丸。治消痰逆。止咳嗽。散痞滿壅塞。開堅結。

痛悶。

於本方。加半夏。紅皮。

用乾生薑。

為末。麪糊為丸。如小豆大。生。

薑湯下。二三十九。日三服。

吐後。渴欲得水。而貪飲者。

腹者。正此湯用甘草之意。又按金鑑。朝食暮吐者寒也。食已而吐者火也。此寒火二字。改爲虛實。其理自通。尤氏又曰。丹溪治小使不通。用吐法。以開提肺氣。使上竅通。而下竅亦通。與大黃甘草湯之嘔吐。法雖異。而理可通也。亦是胃反。吐而渴欲飲水。

按此條證。中焦蓄水。氣液爲之壅遏。不能升騰滋養。故使渴欲飲水。李氏以爲津液亡者。誤矣。宜參傷寒論輯義五苓散條又此

方。桂枝佐苓朮等。以溫散水飲。生薑以降逆氣。尤氏以爲散邪氣者。亦誤矣。

茯苓澤瀉湯方



按高世拭曰。食已卽吐者。非宿穀不化之胃反。乃火熱攻  
冲之吐逆。沈氏曰。此方脾胃乾結者宜之。當與上不可下  
之條。反覆互看。始得仲景前後之意。朱氏曰。胃反病在下  
脘。因無陽氣化穀。故食久反出。今卽吐。明有實邪壅阻中  
脘。不能容穀。若邪阻上脘。并不能食矣。此諸說足與金鑑  
相發。然先兄曰。此證胃中舊有積滯。故新穀入則不能相  
容。霎時變出也。古人屬火之說。恐爲強解。此說爲覈。且朱  
氏謂胃反病在下脘者誤。蓋胃反。胃中無物相得激。故食  
下暫安。而後出也。此方用甘草。取之能緩上迫。遽引大黃  
令下達耳。先兄又曰。千金用單甘草湯。治服湯嘔逆不入。

取四合。熱頓服。日再。兼以人參汁煮粥與服。

又經驗後方。治大人小兒。不進乳食。和氣去痰。人參四兩。

半夏一兩。生薑汁熬一宿。曝乾為末。麪糊丸如棗豆大。每

服十丸。食後。生薑湯吞下。

御藥院方。橘皮枳殼湯。治胸膈氣痞。短氣噎悶。不得升降。

枳殼麩炒去穰

半夏不製各二兩

陳皮不去白三兩

人參一兩

右四味。用泉水五大升。入白沙蜜四兩調勻。用杓揚藥水。

二百四十遍。煮取一大升。去滓。分作三服。一日當服盡。食

後服之。

食已即吐者。



升半餘分再服。作日再。  
下有亦治膈間支飲句。

按魏氏曰。服後多煮白蜜。去其寒。而用其潤。俾黏膩之性。流連于胃底。不速下行。而半夏入參之力。可以徐斡旋于中。其意固微矣哉。此說頗巧。然不如李升璽之穩貼。

醫心方。范汪方。治胃中之氣而歐。欲死方。人參二兩

茯苓二兩 生薑三兩 白蜜五合 半夏三升

洗

凡五物。入蜜。內六升水中。撓之百遍。以餘藥合投中。煮得三升。分四服。禁冷食。治干歐。亦用此。

本草圖經云。李絳兵部手集。療反胃嘔吐無常。粥飲入口。卽吐。困弱無力。垂死者。以上黨人參二大兩。水一大升。煮

嘔吐而病在膈上。外臺後下。有必字。

嘔而脈弱。小使復利。

按尤氏曰。或云嘔與身熱為邪實。厥利脈弱為正虛。虛實互見。故曰難治。四逆湯舍其標而治其本也。亦通。此說不是。姑存之。

嘔而發熱者。

證治準繩曰。金匱方云。潔古用小柴胡湯加青黛以薑

汁打糊丸。名清鎮丸。治嘔吐脈弦頭痛。蓋本諸此。按保命集名青

鎮丸。

大半夏湯方

本草圖經引。半夏三升。二百四十遍。大觀本作一百四十遍。政和本作一百二十遍。二升半。竝作三



本草綱目卷之四

本草綱目卷之四

病人欲吐者不可下之。

朱此摠爲吐家而設大戒。非特指胃反言也。

按傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。其理一也。

又按脈經所載。有出于本經之外者。宜參閱。今拈一條曰。

夫吐家。脈來形狀如新卧起。

噦而腹滿。

按此條恐是錯出。似宜在橘皮湯條上。

茱萸湯方

本草圖經引人參一兩。生薑一大兩。大棗二十枚。

半夏瀉心湯方

按再煮當作再煎。

黃芩加半夏生薑湯方

按大棗十二箇。當作十二枚。

中氣其血不得歸原。故藥難效。遠其根本也。按此說似與經旨相左。然

亦足以互發。仍拈出之。

雞峰普濟方。赤小豆散。治大便秘。即本方

心氣不足。吐血衄血。

按趙氏曰。心氣不足者。非心火之不足。乃真陽之不足也。

此說屬慎。尤氏暗駁正之。實本于醫通。趙又曰。若濟衆方。

用大黃治衄血。更有生地汁。則是治熱涼血。亦瀉心湯類。

耳。此尤所本。

○嘔吐噦下利病脈證治第十七

問曰。病人脈數。數爲熱。脈弦者虛也。以下脈經爲別條。



婦人良方曰。糞後下血者。其來遠。糞前有血者。其來近。遠近者。言病在上下也。

張氏醫通曰。千金用伏龍肝湯。卽治先便後血之黃土湯中。除去求附。加乾薑。牛膝。地榆。髮灰。與金匱主治。則有寒熱之殊。不可不辨。可見治血。但使歸經。不必論其遠近也。外科正宗內痔治驗曰。大抵此症所致之由不同。當究其因治之。如元氣有餘。形黑氣盛。先糞而後紫血者。要兼脈實有力。此屬有餘。法當涼血止血。藥應自效。至若形體瘦弱。面色痿黃。先鮮血而後糞者。要兼脈虛無力。此屬不足。豈可反用涼藥止之。致傷脾胃。此症若不溫中健脾。升舉

下血先便後血。此遠血也。

按徐氏曰。下血較吐血。勢順而不逆。此病不在氣也。當從腹中求責。故以先便後血。知未便時血分不動。直至便後努責。然後下血。是內寒不能溫脾。脾元不足。不能統血。脾居中土。自下焦而言之。則爲遠矣。此說似是。仍存之。

下血先血後便。此近血也。

趙此出大腸。故先血後便。以溼熱之毒。蘊結不入於經。滲於腸中而下。赤小豆能行水溼。解熱毒。梅師方皆用此一味治下血。況有當歸破宿養新。以名義觀之。血當有所歸。則不妄行矣。



凝而不流。積而不散。得熱之和者。則運行經脈。外充九竅。得熱之甚者。風自火狂。則波濤洶起。由是觀之。吐血者風火也。

柏葉湯方

本草圖經云。張仲景方。療吐血不止者。柏葉湯主之。青柏葉一把。乾薑三片。阿膠二銖。炙。三味。以水二升。

煮二升。去滓。別絞馬通汁一升。相和合煎。取一升。綿濾。一服盡之。

按本草黑字。柏葉。艾葉。並味苦微溫無毒。白字。乾薑。止血。

程氏所舉神農經。及馬通性用。並黑字文。

陶氏本草序例曰。云一把者。重二兩為正。

按醫心方。稍有異同。宜參。又引

范汪方云。膠一延。如三指大。長三寸者。一枚是也。

朱氏曰。千金方。有阿膠三兩。亦佳。但近日無真阿膠。徒增粘膩耳。

病者如熱狀煩滿。

按而渴。疑不渴。譌。蓋血熱諸條。有但欲漱水證。不敢言有

渴。驗之病者。亦必不欲嚥。且而不互錯。往往見之。宜攷輯義水氣

篇徐氏曰。瘀血症。不甚則但嗽水。甚則亦有渴者。蓋瘀久

而熱鬱也。殆是望文生義者已。

心下悸者。半夏麻黃丸主之。

本草圖經引張仲景傷寒論同。

按趙氏論悸有三種。文繇不錄。

吐血不止者。

趙止作足。

趙夫水者。遇寒則沈潛於下。遇風則波濤於上。人身之血與

水無異也。得寒而和。則居經脈內。養五藏。得寒之凜冽者。則



之盲膜。然陽道顯。陰道隱。氣在盲膜者。壅脹顯於外。血積隧道。惟閉塞而已。故腹不滿。因閉塞自覺其滿。所以知瘀血使然也。

按脈經所謂。當汗出不汗出為瘀血。亦出外臺小品芍藥地黃湯主療。及巢源傷寒諸候中。且芍藥地黃湯方後云。其人喜忘如狂者。加地黃三兩。黃芩三兩。其人脈大來遲。腹不滿。自言滿者。為無熱。但依方服。不用黃芩也。右據宋本錄。千金加地黃。作加大黃。為是。末句。作但依方。不須有所增加。无不用黃芩也字。據此。此條證。即芍藥地黃湯所主也。

又按脣痿之痿。本是萎字。即失色之謂。金鑑以痿痺釋。誤。

浮當是脈沈。文義始屬。必傳寫之譌。金鑑說不安。蓋脈浮。是血逆之候。沈弦。是血虛之徵。

夫吐血欬逆上氣。

按聖惠方脚氣門曰。上氣脈數。不得卧者死。蓋病屬虛。及實中挾虛者。見此脈證。必為不治。

夫酒客欬者。必致吐血。

醫心方引醫門方也。字作難療二字。

病人胸滿。唇痿舌青。

趙是證瘀血。何邪致之耶。內經有墮恐惡血留內。腹中滿脹。不得前後。又謂大怒則血菀於上。是知內外諸邪。凡有所搏積。而不行者。即為瘀血也。積在陰經之隧道。不似氣積於陽。



師曰。尺脈浮。目睛暈黃。衄未止。

**鑑**浮脈主陽主表。若目睛清潔。主陽表病也。目睛暈黃。主血脈病也。蓋以諸脈絡於目。而血熱則赤。血瘀則黃。今日睛黃暈。知其衄未止也。若暈黃去。目睛慧了。知其衄已止。

按尺脈以候血分。金鑑似是。暈黃去。目睛慧了。其脈靜者。可推而知也。周禮注。鄭司農云。暈。謂日光炁也。暈字釋名

曰暈。捲也。氣在外捲結之也。日月皆然。

病人面無血色。無寒熱。

按面無血色。無寒熱。是該衄下血吐血而言。徐氏曰。煩欬條不言脈。浮弱二字貫之也。又金鑑曰。脈沈。當是脈浮。脈

明安其宅。苟有所傷。則氣虛而脈動。動則心悸神惕。精虛則脈弱。弱則怔忡恐悸。蓋驚自外物觸入而動。屬陽。陽變則脈動。悸自內恐而生。屬陰。陰耗則脈弱。是病空和平之劑。補其精氣。鎮其神靈。尤當處之以靜也。朱因物所感。則爲驚。神虛怵惕。則爲悸。分言之。似有動靜虛實之別。而驚則未有不悸。悸則未有不驚者。其原流自屬一致。仲景獨取寸口。以動而弱三字。繪出驚悸之脈象。而仍分疏之。曰。何以知其爲驚。以其脈之厥厥動搖也。何以知其爲悸。以脈動之中。而自軟弱也。則脈之動而弱。必兼見。則症之驚與悸。亦相因而生。此自然之理也。



屬溼熱。治在疎蕩。其陰屬寒溼。治要溫利。後世以茵陳附子併用者。卽寒溼之治已。如茵陳五苓散證。豈溼熱發黃之輕者乎。此諸黃者。皆病之屬裏者也。如桂枝加黃耆湯證。溼熱鬱表。亦陽黃之類已。此他傷寒論中發黃諸條。不一而足。皆與本篇互發。學者宜參互詳審焉。

○驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證治第十六

按胸滿是瘀血中一證不

宜於篇題中有此二字從刪爲是

按驚悸心疾。血心之所主。此其所以合爲一篇歟。

寸口脈動而弱。

趙心者。君主之官。神明出焉。不役形不勞心。則精氣全。而神

瓜蒂湯

外臺延年秘錄療急黃心上堅硬渴欲得水喫氣息喘  
蠱眼黃但有一候相當即須服此瓜蒂散吐則差方

於仲景原方中去香豉○又許仁則方有用瓜蒂丁  
香赤小豆搗篩末以新汲水和一方寸匕與服者

千金麻黃醇酒湯

外臺疽作癰本草傷寒類要引張仲景傷寒論文稍與外臺同二升半作半升下有

去滓二字

餘述按黃疽之病有陰陽二證要有溼勝燥勝之異今攷  
經文酒疽陽而屬燥者也故治主清涼女勞疽陰而屬燥  
者也故初治從和中而末治須潤導穀疽有陽有陰其陽



按趙說是。蓋女勞疸初起之證治也。先兄曰。上條有手足中熱。膀胱急。少腹滿諸證。而此特舉小便自利者。使人推知其他也。今與虛勞篇相參。其膀胱急。少腹滿者。尤氏所謂陽病不與陰和。則陰以其寒獨行。為裏急。為腹中痛。而其實非陰之盛者。若身體盡黃。手足中熱。亦尤氏所謂陰病不能與陽和。則陽以其熱獨行。為手足煩熱。而實非陽之熾者。陰陽不相和諧。外生虛熱。而所為黃病。非土色外呈之候。其用小建中湯者。意在使陰陽相就。而寒以溫熱以和也。

附方

可也。

按陽明篇曰。陽明病。不能食。攻其熱必噦。所以然者。胃中虛冷故也。以其人本虛。攻其熱必噦。正與此條同機。聖惠方。治陰黃小便色不變。欲自利而不利。腹滿而喘者。必噦。噦者。宜服小半夏湯方。

於本方。加人參。葛根。

男子黃。小便自利。

趙男子黃者。必由入內虛熱而致也。反見小便自利。為中下無熱。惟虛陽浮沈為黃耳。按沈疑泛字。故與治虛勞之劑補正氣。正氣旺。則營衛陰陽和。而黃自愈矣。



大黃消石湯方

千金消石作芒消難從宋本外臺煮取二升半去滓內消石更煎取一升先食頓服

按消石礬石散及此方不用芒消而用消石者蓋以芒消

潤品不宜溼熱故取于火消之燥且利焉。繇是觀之則今

之醫治陽明病於承氣湯中換用消石者坐于不深研經

旨矣。

黃疸病小僂色不變欲自利。

朱此黃疸中之中氣虛寒者小僂色不變非時下無壅熱并

見虛寒之象乃自利腹滿而喘是濁邪橫逆清氣不運使醫

者誤認腹滿而喘為實熱反以寒藥除之益致胃敗而為臧

且以小半夏湯溫通上焦以止逆除噦而後漸次調理脾胃

沈氏尊生書曰。有服對證藥不能效。耳目皆黃。食不消者。是胃中有乾糞也。宜飲熬猪油。量人氣稟。或一杯。或半杯。日三次。以燥糞下爲度。卽愈。

黃疸病茵陳五苓散主之。

按此條不言何疸。殆是穀疸之輕證。否則溼邪內鬱所致乎。

黃疸腹滿。小便不利而赤。

按此條不言何疸。蓋是穀疸之最重者也。自汗出。爲裏熱蒸迫之候。諸注以爲表和者。非是。蓋此證一屬裏實。故舉表和二字。以徵自汗之非表邪也。



按桂枝加黃耆湯證。卽溼邪表鬱者。蓋與溼家身色如熏黃。有陰陽之別。

諸黃。猪膏髮煎主之。

按趙氏旣引傷寒類要。以證此條之爲血燥。然其說冗雜不覈。仍不採入。

猪膏髮煎方

聖惠治黃疸。耳目悉黃。食飲不消。胃中脹熱。此腸間有燥糞。宜服此方。

右煎鍊猪脂五兩。每服抄大半匙。以葱白湯頻服之。以通利爲度。

聖濟治赤白痢。礬石九。白礬。四兩消石。一兩搗為末。云用

米醋浸炊餅心九。如梧桐子大。每服十九。空心米飲下。

魏氏家藏方。消礬圓。治暗風癰病年深者。

於本方。消石半兩。白凡一兩。枯。加赤石脂。二兩。火煨。為細末。糯米粥為

圓。如菉豆大。每服十五圓。食後溫水下。日進三服。一日

一次發者。服之半月。永除根本。

酒黃疸。心中懊懣。首句外臺。作酒瘴者。

按此上條脈沈弦者之治也。

梔子大黃湯

宋本外臺。梔子七枚。擘。枳實破。水漬。炙。香豉一升。綿裹。分溫三服。作下去滓。溫服七合。日三服。

諸病黃家。但利其小便。



書其稱難治者。在傷寒論則七見。在本經則五見。大抵謂病寒熱相錯。虛實互呈。其治不得純一。有所顧慮者。宜深

味焉。

余嘗著虛實論。既有詳說。錄在藥治通義中。宜參。

消石礬石散方

圖經引作消石熬黃礬石燒令汁盡。二物等之。合。挾絹篩。大麥粥汁和服。方寸匕。日三。重衣覆。

取微汗。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑也。大麥用無皮者。

按此方用大麥粥。其理與石膏配粳米相同。藥性論云。消

石。君惡。曾青。畏粥。

本草綱目曰。綠礬。燥。溼化涎。利小便。消食積。故脹滿黃腫。

瘡。疔。疳。疾。方。往往用之。其源則自張仲景用礬石消石。治

女勞黃疸方中。變化而來。

此方治胃熱其病位本不同且此方大黃二兩彼則一兩

此方其劑大彼則劑小可知此方力重於彼喻氏亦以此

為輕誤矣

施子櫟皮湯麻黃連軹赤小豆湯  
二方傷寒論述義有詳說茲不贅

又按尿如皂角汁狀此溼去之徵故曰黃從小便去也

幼幼新書吉氏家傳治小兒身體黃及小便黃眼白睛黃

即是疸也宜此方

於本方加朴消

黃家日晡所發熱而反惡寒

外臺疸作瘰本草圖經引亦  
疸作瘰其腹脹作腹臃脹滿

按發熱而反惡寒金鑑說為是尤注難從

又按此證本是虛因而更有水蓄腹滿故云難治蓋仲景



痺疸相同之明徵也。又刺瘡篇。胃瘡者。令人且病也。太素  
且作疸。注。疸音旦。內熱病也。

穀疸之爲病。寒熱不食。

沈濁氣內壅。所以心胸不安。不安者。卽懊懷熱痛之類也。

### 茵陳蒿湯方

趙氏曰。蓋茵陳湯治熱結發黃。佐梔子。去胃熱通小便。更  
以大黃爲使。蕩滌之。雖然治疸不可不分輕重。如梔子柏  
皮湯。解身熱發黃。內熱之未實者。麻黃連翹赤小豆湯。治  
表寒溼。內有瘀熱而黃者。大黃硝石湯。下內熱之實者。梔  
子大黃湯。次之。茵陳湯又次之。○按梔子大黃湯治上熱。

按此條言黃疸有因火劫得者。然此病多自溼得之。而其證有二端。尤氏謂非內兼溼邪。則熱與熱相攻。而反相散者。恐失其當。如傷寒火逆條。兩陽相熏灼。其身發黃。風溫被火。微發黃色。陽明病被火。必發黃。俱不內兼溼邪者。腹滿舌痿黃。

按趙氏曰。黃疸之黃深。實熱之黃。痿黃之黃淺。虛熱之黃。當攷。

疸而渴者。其疸難治。

按趙氏曰。疸卽瘰也。單陽無陰。此說本于聖濟。未確。蓋發黃用瘰字。見玉機真藏論。胃熱用疸字。見平人氣象論。此



本氣而患之。本氣虛寒者。本不患熱。惟患其溼。眞陽素旺

者。不患其溼。而患其熱。

此本于張介賓酒泄說。然其意少異。

蓋酒疸之證。舒

氏所謂。不患其溼。而患其熱者也。

酒疸心中熱。

按此上條脈浮者之謂。似不必與懊懷有微甚之別。

酒疸下之。久久爲黑疸。

按據巢源千金。諸疸皆久爲黑疸。雖黑微黃。蓋通言之。不

特自酒疸變者。

變作桃皮色。亦本于巢源。

尤氏以女勞疸對言。然女勞

疸亦尺脈浮。身盡黃。不必脈沈身純黑。

師曰。病黃疸。

通則濁雖下流而不外出。於是陰受其溼。陽受其熱。轉相流被。而身體盡黃矣。朱氏曰。是太陰雖被寒鬱。而鬱久化。成之溼熱。流禍膀胱。竝是。

又按女勞疸。注家以爲腎熱。其說誠是。蓋入斷喪太過。精液虧乏。則腎中之陽必亢極。營血爲之鬱黷。遂爲發黃也。又此證小便自利。魏氏曰。陽虛氣降。無所收攝。節制也。金鑑曰。膀胱急。小便利。下焦虛也。腹滿如水狀。脾腎兩敗。故謂不治也。亦是一說。蓋此證本是下虛。故其初小便不禁。久而真元閉絕。小便不利。遂至腹如水狀也。

又按舒氏傷寒論集注曰。酒中有熱有溼。均足爲患。因其



是風痺相搏四字。

此愚弱冠時說。極知臆妄。然痺字遂難解。注家循文解釋。不免牽強。仍姑存錄。

以俟識者。倉公傳曰。風痺客勝。難於大小溲溺赤。

跌陽脈緊而數。

趙女勞疸。惟言額上黑。不言身黃。省文也。後人雖曰交接水

中所致。特其一端耳。

按先兄曰。尺脈浮為傷腎。跌陽脈緊為傷脾。二句插入。以

對示女勞疸穀疸二證之脈。此不承食即為滿句。亦不接

風寒相搏句。注家與上下相連為解。殆覺踳謬。又陰被其

寒。諸注以陰為腎藏。似失當。特尤氏曰。穀不消而氣以瘀。

則胃中苦濁。濁氣當出下竅。若小便通。則濁隨溺去。今不

尤脾臟瘀熱而色黃。脾者四運之軸也。脾以其所瘀之熱轉輸流布而肢體面目盡黃矣。故曰瘀熱以行。

按平人氣象論曰。緩而滑曰熱中。邪氣藏府病形篇曰。緩者多熱。平脈法曰。緩者胃氣實。實則穀消而水化也。又傷

寒論曰。傷寒脈浮而緩。手足自溫者。是為繫在太陰。太陰

者身當發黃。合此諸義觀之。則知是緩為胃熱。而浮緩為

發黃之診。又知浮則為風之風。即熱氣外熏之謂。傷寒論有此例

非邪氣中表之義。又知緩則為痺之痺字。蓋是痺字之譌。

始與文義相叶。緩痺煩三字韻。黃行二字韻。顧以其譌作痺。後人不辨。

遂補痺非中風一句也。再按痺非中風一句。推他文例。當



百一選方。治一切浮腫。水氣亦可治。

於本方。加吳茱萸。茯苓。生薑水煎。

奇效良方。加味枳朮湯。治氣為痰所隔。心下堅脹。名曰氣

分。

枳殼。白朮。辣桂。紫蘇。陳皮。檳榔。桔梗。五靈脂。木香。

各一分

半夏。茯苓。甘草。

各二分

每服二錢。水二盞。生薑三片。煎至

一鍾。去滓。食前溫服。

○黃疸病脈證并治第十五

論二首

脈證十四條

方七首

按當作六首

寸口脈浮而緩。

十五九

聖惠治癖結不能飲食。心下虛滿如水者。枳實散方。

於本方加半夏。生薑。水煎。

又治膈氣心胃間痛方。

於本方加神麴各一兩。為散。不計時候。熱酒調下一錢。

又治飲癖氣分。心下堅硬如杯。水飲所作。桂心散方。

於本方加桂心。細辛。附子。檳榔。薑。棗。用枳殼。水煎服。此按

嚴氏枳朮湯祖方

又治飲癖。心下堅大如杯。時復疼痛。宜服此方。

於本方加桂心。生薑。



求以補脾。用枳以抑胃。後人不知胃強脾弱用分理之法。

咸謂一補一消之方。再按局方之四物湯。二陳湯。四君子

湯。易老之枳求丸。皆從金匱方套出。能明乎先聖立方大

義。後人之方不足法矣。按胃強脾弱補脾抑胃竝似迂曲。

外臺文仲。徐王枳實散。宜春秋服。消腫利小便。兼補療風

虛冷脹不能食方。

枳實半斤桂心一斤茯苓白朮各五兩為散。酒服方寸匕。日

三服。加至二匕。

千金月令。主結氣方。

白朮。枳殼炒。右等分。搗篩。蜜丸如梧子大。空腹飲下二

醫學綱目曰。氣分。謂氣不通利而脹。血分。謂血不通利而脹。非脹病之外。又別有氣分血分之病也。蓋氣血不通利。則水亦不通利。而尿少。尿少。則腹中水漸積而為脹。但氣分。心下堅大。而病發于上。血分。血結胞門。而病發于下。氣分。先病水脹。後經斷。血分。先經斷。後病水脹也。按樓氏此說。湊合水

分爲言殊屬刺謬

枳朮湯方

外臺兩見。竝作白朮三兩。本草引同。無白字。外臺引備急及本草亦水五升。作水一斗。

侶山堂類辨曰。金匱要略用枳朮湯。治水飲所作。心下堅。大如盤。蓋胃為陽。脾為陰。陽常有餘。而陰常不足。胃強脾弱。則陽與陰絕矣。脾不為胃行其津液。則水飲作矣。故用



皮水與此牴牾然其屬黃汗者為是

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯方

外臺引深師名附子湯主證與本條同甘草炙麻黃

去節三兩細辛三兩附子冠大字大棗有擘字煮麻黃下有再沸二字方後云仲景傷寒論名桂枝去芍藥加麻黃細辛附子

湯趙本作桂薑草棗黃辛附子湯方

心下堅大如盤

本草圖經引无邊如旋盤四字宋本外臺飲痺門引備急亦作枳實求湯

按上條與此條其病俱在內與外體浮腫者不同今編在

本篇者未詳其解疑是痰飲篇中所錯也

巢源氣分候曰夫氣分者由水飲搏於氣結聚所成氣之

流行常無壅滯若有停積水飲搏於氣則氣分結而住故

云氣分

參生薑黃飴十兩。煮之。竭得七升。服一升。消息更服。今案本草

桂一尺。重半兩。為正。○按右出其第十卷治通身水腫方中。未知果是本經之遺否。姑附于此。

餘述按本篇首敘四證。而篇中特舉風水皮水。不及正水。

石水。其論治法。有云可下之。有云當利小便。有云當發汗。

今攷篇中。殊詳于發表之方。而至攻下滲利之藥。則缺而

不出。豈皆是後人之所刪難。抑仲景之引而不發者乎。

黃汗之病。

先兄曰。此條當為五節讀。首二句。概稱黃汗之證也。而下

曰歷節。曰勞氣。曰生惡瘡者。以其與黃汗相類。而實不同。

舉以示之也。歷節必兼寒邪。故周身發熱。尤氏所舉第四條文。彼注屬之



按少陰。卽與傷寒少陰病同義。係于表虛寒之謂。其用麻黃附子甘草湯。取之溫發。沈氏說雖巧。猶未免牽湊。厥而皮水者。

醫心方。張仲景方。青龍湯。治四支疼痛。面目胗腫方。

麻黃半斤

去節去末

細辛二兩

干薑二兩

半夏

洗

凡四物。切。以水八升。煮得二升。一服止。

又。又云。治脾胃水。面目手足胗腫。胃管堅大滿氣。不能動搖。桑根白皮湯方。

桑根白皮。切。二升。

桂。一尺。

生薑。三顆。

人參。一兩。

凡四物。切。以水三斗。煮取桑根。竭得一斗。絞去滓。內桂。人

甘草麻黃湯方

千金翼。麻黃湯。主風溼水疾。身體面目腫。不仁而重方。即本

方重覆。日移二丈汗出。不出更合服之。慎護風寒。皮水用

之良。

祕傳經驗方。走馬通聖散。治諸風溼。及傷風傷寒頭疼。并

治疔瘡一切腫毒。手足疼痛。風痺不仁。

即本方。炒微黃。礮為細末。每服三錢。用水鍾半。鍋內滾

一大沸。涼溫服。蓋被暖不透風。汗出為度。仍要謹慎風

觸。遂無重複。

水之為病。其脈沈小。屬少陰。



按藥有性有用。方之既成。或取其性。或取其用。如此方。則

石膏得麻黃之溫發。但存逐水之用。相藉以驅水氣。石膏逐水

本草不言然仲景用之驅飲者不一而足加求湯。則麻石之功。與前方同。而求

與麻黃相藉。走外之力稍勝矣。性用諸義詳開于拙著藥治通義中

防已茯苓湯方

按此方係于發表利水相兼之劑。防已黃耆俱逐外水。義

具于溼病防已黃耆湯下。須互參。

越婢加朮湯方

按此方與次方所主之證。蓋在輕重劇易之別。不必拘有

熱無熱矣。

之。虛脾空胃。水遂居之。肺為喘浮。注云。肺得水而浮。故言  
喘浮。又巢源傷寒欬嗽候曰。水停心下。則肺為之浮。肺主  
於欬。水氣乘之。故欬嗽。又水腫候中曰。肺得水而浮。浮則  
上氣而欬嗽也。蓋得斯說。而浮欬之義始晰矣。何氏醫碕  
曰。水氣喘  
者。水氣逆行。肺氣得水而浮。觀  
浴河者。水浸至胸。則喘可見。

風水惡風一身悉腫。

按沈以為風多水少之證。恐拘先兄曰。續似續陸續之續。  
汗常出而不止。又前第四條曰。其人不渴。汗出即愈。此為

風水存參。

評熱病論論風水。  
有口乾苦渴證。

越婢湯方



當言其所苦。與治之所急。皆在水。而師反舉胸中痛等證。以爲言。故人疑而設問也。脈經作師脈之不言水。語意最明。太陽上篇問曰證象陽旦條。及脈經中並有同語例。空相參。又關元卽泛稱下焦之名。亦見厥陰篇。及婦人雜病中。又醫以爲留飲。而大下之句。言醫誤認脇下急痛等證。以爲懸飲。支飲之屬。錯用十棗等湯。蓋當時未至身腫。而程氏謂見標證面目身體四肢皆腫云云。而大下之者。殆未爲當。又胃家虛煩之煩。卽太陽下篇吐之內煩之煩。又按脈經引四時經云。土亡其子。其氣衰微。水爲洋溢。浸漬爲池。走擊皮膚。面目浮腫。歸於四肢。愚醫見水直往下。

書中或有曰有若卧蚕纔起之狀者。謬矣。

師曰。寸口脈沈而遲。

或曰。推他文例。跌陽脈伏一句。疑衍。存攷。

蔣示吉醫宗說約曰。有血分症。婦人先經水斷絕。而後四

肢腫滿。小便不通。此血瘀水道。以通經為主。宜小調經散。

問曰。病者苦水。面目身體四肢皆腫。

脈之上。脈經有師字是。

趙此水病。脈之不言水。反言胸中痛等病。當時記其說者以

為異。非異也。是從色脈言耳。

按脈之不言水。反言胸中痛。二言字。沈氏屬之病者。

本于徐氏。

趙氏則屬之醫師。殊覺妥協。蓋此病者洪腫。如以常情。則



胸滿短氣來。或曰。此二條。前條是客。不過舉其有寒者。以爲照對。實無干水病。後條是主。示水之因熱生者。此說亦有理。姑附存之。

又按趺陽平脈。貴沈實不貴浮露。故尤氏以伏爲平脈。辨脈法曰。趺陽脈遲而緩。胃氣如經也。其意一也。但後條有寒水相搏。趺陽脈伏語。義相矛盾。當攷。又辨脈法曰。趺陽脈微而緊。緊則爲寒。微則爲虛。微緊相搏。則爲短氣。夫水病人。目下有卧蚕。

按靈樞。無目下微腫如蚕之文。趙氏錯引。蓋目下如卧蚕者。色黃晶腫。如新卧起者。眼胞上厖然虛浮。其證自異。方

跌陽脈當伏。今反數。

徐此二條。言水病人別有宿病。人各不同。當從跌陽脈。與其舊疾見證別之。尤跌陽雖係胃脈。而出於陰部。故其脈當伏。今反緊者。以其腹中宿有寒疾故也。寒則空溫。而反下之。陽氣重傷。卽胸滿短氣。其反數者。以其胃中有熱故也。熱則當消穀而小便利。今反不利。則水液日積。故欲作水。夫陰氣傷者。水爲熱畜而不行。陽氣竭者。水與寒積而不下。仲景竝舉二端。以見水病之原有如此也。

按諸家以跌陽脈伏爲病脈。尤氏特以爲平脈。而其注義亦暢。仍表出之。要推尤意。此欲作水一句。總括二條。亦頂



隱癰。身體爲痒。痒者名泄風。久久爲痂癩。林億等注。眉少髮稀。身有乾瘡。而腥臭也。

寸口脈沈滑者。中有水氣。

擁上諸本有微字。輯義偶脫。

按靈樞論疾診尺篇。視人之目窠上。微癰如新卧起狀。其頸脈動。時欬。按其手足上。窅而不起者。風水膚脹也。此本條所原。先兄曰。擁。臃同。腫起也。

太陽病。脈浮而緊。

按身腫而冷。狀如周痺。程氏屬之黃汗。恐佳。痛在骨節。亦是黃汗。尤說爲是。

跌陽脈當伏。今反緊。

寒字。句。疝瘕。空下。接腹中痛讀。

而不行。氣水同類。氣停則水生。所聚之液血皆化水也。程氏曰。氣者水氣也。形盛於外。為氣強。內經曰。津液充郭。其魄獨居。即氣強之意也。魏氏曰。氣者水氣。即溼邪也。溼邪挾風邪。作熱于表也。尤氏曰。風天之氣。氣人之氣。是皆失其和者也。風氣相搏。風強則氣從風。而侵淫肌體。故為癰疹。氣強則風從氣。而鼓湧水液。故為水。風氣並強。兩相搏擊。而水液從之。則為風水。汗之則風去。而水行。故曰汗出乃愈。尤注與金鑑相發。最為穩貼。身痒多屬表虛。特桂麻各半湯證。以不得小汗

出身痒。即是表鬱。豈此條之類乎。

平脈法曰。脈浮而大。浮為風虛。大為氣強。風氣相搏。必成



相徵矣。至石水。則攷之巢源。其水沈凝不行。亦不上泛。殆

近水鼓者也。雞峰方。又以爲腹脹如鼓。按之堅硬。腹中時

痛。謂之石水。繞臍堅硬。腹不痛者。謂之鼓氣。是以痛不痛

爲別。恐非確論。又有治石水。用防已椒目葶藶大黃丸治

驗。文繇不錄。空閱。巢源又有毛水候。亦是皮水。又有大腹水腫候。亦即正水。並宜相參。又三因皮

水。据巢源處以五皮散。

脈浮而洪。浮則爲風。相擊。徐沈朱作相擊。非惡風以下入字。聖濟總錄引作惡風者爲風水。

按此條。風強氣強二證。是客風氣相擊證。是主。宜分別看。

汗出乃愈。專屬風水而言。不統前二證。趙氏曰。風者。外感

之風也。氣者。營衛之氣也。所謂氣強者。衛因熱則拂鬱停

水腫之正證。水熱穴論曰。故水病下爲臑腫大腹。上爲喘呼不得卧者。標本俱病。故肺爲喘呼。腎爲水腫。肺爲逆不得卧。分爲相輸俱受者。水氣之所留也。水脹篇曰。水始起也。目窠上微腫。如新卧起之狀。其頸脈動。時欬。陰股間寒。足脛腫。腹乃大。其水已成矣。以手按其腹。隨手而起。如裹水之狀。此其候也。俱是正水之謂耳。雞峰普濟方曰。病腫者。皮膚緊急。腫滿無文。沒指。若目下微腫。如卧蚕之狀。及足脛皆腫。小便不利。其人喘急。脈沈大而疾。此由脾腎虛弱。腎虛水不能畜。水氣揚溢。脾胃虛則不能制水。水氣流散於經絡。經絡水病。故能腫滿。謂之正水。此說甚覈。足以



字。臃。

按風水亦外證。臃腫其不言者。蓋係省文。醫通以爲金鑑脫文。似此。

以從上腫。從下腫。辨風水皮水。恐失拘執。輯義附程請爲附程當作鑑。

又皮水其腹如鼓云云。宜從巢源及脈經注。改正爲順正。

水徵以水熱穴論。水脹篇則此證亦必腹滿。今不言者亦。

係省文。金鑑言胸滿自喘者。非是要之風水皮水以表邪。

有無爲辨。正水石水以喘不喘爲別。其他證候皆宜類推。

也。醫通引經是大奇論。水熱穴論評熱病論陰陽別論。然錯綜顛倒頗加改易。學者宜攷原文。

又按內經之風水爲腎虛招風以爲水氣。遂變正水者。仲。

景之風水指邪水專鬱于表者而言。其證稍異。又正水蓋。

若渴欲飲水口乾舌燥者。

按此條既出陽明篇中則猶是似非真消渴然以為中消證治亦無所妨。

猪苓湯方

猪苓去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠烱消溫服七

合日三服

按此方輯義偶脫今照原本錄補

○水氣病脈證并治第十四

論七首

脈證五條

方九首

按此數目並有譌當考

師曰病有風水有皮水

脈經其腹如鼓下注曰如鼓一作如故不滿癰腫輯義誤寫作癰腫諸本皆作



渴不止。文蛤味鹹性寒。寒能除熱。鹹能潤下。用以折炎上之勢。而除熱渴之疾也。此亦一說。姑存之。

小便不利者。有水氣。

按朱氏以爲上焦有熱。下焦有寒。因渴而小便不利。誤矣。

此證之渴。卽下焦蓄水。而升騰之氣液失常之所致。括樓

根。不啻生津液。亦能行水氣。觀柴胡桂枝乾薑湯。

此方治飲結說

見傷寒論述義

及牡蠣澤瀉散。而可見也。此方用治小便閉。宜用

腎氣丸。而其人厭泥戀者甚驗。危氏得效方。附子散。治小

便不通。兩尺脈俱沈微。乃陰虛故也。用綿附子。澤瀉。各一

兩。燈心七莖。水煎服。亦此意也。

今錄驗。雖分爲三。其實亦不過脾腎二藏之病已。渴之爲  
候。必自胃熱。而上焦之熱。必止咽燥。所謂口燥不渴者。皆  
爲膈有熱。而胃無熱者言。然則仲景不及上消者。其意殆  
可見也。迄至宋金諸哲。以三消配之三焦。衛生家寶簡易方直指方保命  
集等是也近日和田泰純嘗疑其說。不能無理。但內經有肺消  
鬲消之名。而厥陰病。既有消渴。蓋爲胃津竭乏。遂及胸堂  
者。乃不得言必無上消證。不敢臆定。以俟識者。

渴欲飲水不止者。

沈此亦非真消渴也。

按尤氏曰。熱渴飲水。水入不能消其熱。而反爲熱所消。故



土失權而致者。即所謂癖囊也。癖囊之名。今世多唱之者。

而少知其實為支飲者。又莫識支飲之證。得許氏之言而

其理更明者。故愚今表而論之。癖囊本作癖囊。出千金痰飲中。

○消渴小便利淋病脈證并治第十三。小便利。徐沈周尤朱作小便利。字從。

寸口脈浮而遲。

按巢源。以此條收之虛勞候中。可以確金鑑說矣。

跌陽脈浮而數。

證治要訣曰。中消消脾。脾氣熱燥。飲食倍常。皆消為小便利。

男子消渴。小便利反多。

餘述按本篇之敘真消渴。僅此二證。即消中與下消也。古

者。是水停胃內。從胃中而上。越於口也。

餘述許學士稱。平生疾膈中停飲。覺酒止從左邊下。漉漉有聲。脇痛。飲食殊減。十數日必嘔數升酸苦水。後揣度之。已成癖囊。如潦水之有科。曰。不盈科不行。水盈科而行也。清者可行。濁者依然渟滯。蓋下無路以決之也。是以積之五六日。必嘔而去。稍寬數日復作。脾土也。惡溼。而水則流溼。莫若燥脾以勝溼。崇土以填科。曰。則病當去矣。於是悉屏諸藥。一味服蒼朮。三月而疾除。云云。愚以爲許氏所患。卽支飲中一證。其所辨說。殊爲精核。蓋如苓桂朮甘湯。澤瀉湯。小半夏。及加茯苓湯。茯苓飲等證。皆是支飲之自脾。



兼備亦未必非一人兼備。且所處之藥皆著其功。如更發他證者。是不必藥之所致。要不過假此數端以示爲治之次第也。其初則時氣觸動。而其次則下焦水逆。次則肺飲復動。次則中焦飲遏。次則水氣外溢。於是水飲之情狀纖悉無遺。而加以兼虛挾熱。可謂密矣。

先渴後嘔爲水停心下。

徐飲有久暫不同。此云先渴後嘔。渴必多飲。從無嘔證而忽於渴後見之。其爲水飲無疑矣。故曰。此屬飲家。暫時傷飲也。鑑水停心下。中焦部也。中焦屬胃。故不止病悸短氣。而亦病嘔也。病悸短氣者。是水停胃外。從膈下而上干於胸也。病嘔

若面熱如醉。

按此上四條。如云治其氣衝而承以衝氣卽低之類。其文上下相應。特此條自爲起端。故程氏尤氏以爲別證。然其治仍守上方。則知亦接上來矣。面熱如醉者。卽前段所謂面翕熱也。其初胃熱未長。故不敢爲意。今蓄飲未散。而胃熱增劇。故加大黃以利之。徐氏所謂雖有薑辛之熱。各自爲功。而無妨者。實得其理矣。

千金方衍義引趙氏今二注本無攷

又按以上六條。皆設法備變者也。蓋病有證候錯雜。或陸續變替。乃不可不就其所急而爲之處療者。是此諸條之所以設。而使人知圓機之妙者已。唯所敘諸證未必一人



水去嘔止其人形腫者。

尤血虛之人陽氣無偶發之最易厥脫。麻黃不可用矣。杏仁味辛能散味苦能發力雖不及與證適宜也。

按水去卽心下之水去故嘔止是半夏之功著矣。然內水外溢以爲形腫故治猶遵前法而表水非麻黃不能驅除。蓋杏人之與麻黃其性雖有緊慢之別而其功用則稍相均。以其人血虛故以此易彼耳。其人遂痹者前段手足痺也。厥者亦卽前段手足厥逆倘得麻黃以亾其陽則更甚也。血虛者尺脈微之應也。此無救逆之法顧證旣至此則宜別處固陽救液之藥非前方加減之所治矣。

欬滿卽止而更復渴

趙服湯後欬滿卽止三變而更復渴衝氣復發以細辛乾薑乃熱藥服之當遂渴反不渴支飲之水蓄積胸中故也

按此節當以至爲熱藥也爲一截看欬滿卽止是薑辛之功著然藥勢燥胃故爲渴而下焦之水亦隨發動此際更宜苓桂五味甘草湯者意在言外矣服之以下是接上文治其欬滿句言服之欬滿卽止當發渴而反不渴者爲心下有支飲也渴反止趙氏注爲反不渴讀程氏亦然宜從此支飲與青龍證不同所謂冒者卽前條時復冒之加重者也復內半夏者所以驅水飲止嘔逆也



也。此解似佳。唯尺脈微。豈爲血虛而現乎。手足厥逆者。陽素不盛。今爲飲遏住所致。與瓜蒂散之厥。其情相近。氣從小腹上衝胸咽者。下焦之水上逆也。手足痺者。其人血虛故也。其面翕熱如醉。復下流陰股者。胃中有熱。被飲迫動。或升或降也。小便難者。膀胱不輸也。時復冒者。卽是心下支飲之故。而有時失升也。此證三焦俱有水。加以血虛與胃熱。然其所急。特在氣衝。故先用桂苓五味甘草湯。以抑逆散飲。此方比之苓桂朮甘湯。有五味而少朮。彼以胃爲主。而此猶兼肺。故用五味以利肺氣。比之苓桂甘棗湯。彼飲在下。而此飲在上也。

備諸般表候也。

青龍湯下已。多唾口燥。

按下已者。服畢也。多唾者。青龍之功著。而飲豁之微。猶今之患支飲者。及其欲愈。必吐稠痰。唾亦稠痰也。

宜參肺病及前篇辨

中吳

口燥者。亦飲去之徵。與渴同機。續後三條。俱舉藥驗。

此證亦卽是已。而欬止息平。義寓其中矣。此下脈證。非爲青龍湯而發。以其飲所在。不特上焦。亦瀦於中下。而更或有所挾。今服湯之後。支飲雖散。他證嗣見者也。寸脈沈。尺脈微者。魏氏曰。寸脈沈者。支飲有窠囊。欲去之而不能盡去也。尺脈微者。正陽虛于下。而陰寒之氣。斯厥逆而上奔。



脈弱者久病正虛是其常也。久病而邪亦衰是其幸也。可以  
于補正氣。寓逐水飲之法。治之。徐徐可收功也。故曰可治。若  
夫診其脈而實而大而數。則正虛而邪方盛。欲補其正。有妨  
于邪。欲攻其邪。有害於正。可決其死也。然此亦為治之不如  
法者言耳。苟能遵奉仲景以扶陽益氣為本。以溫中散寒清  
熱散邪為斟酌。以導水于二便。宣水于發汗為權宜。何遽致  
于必死乎。

欬逆倚息不得卧。

按此即首條支飲證也。蓋其人上焦素有停飲。今時氣所  
觸。相搏犯肺。以為此證。故與小青龍湯。雙解表裏。然非敢

今則胸中宗氣爲飲邪搏結。有似兼懸飲之痛矣。夫病久邪盛。似可卒歿。乃仍遷延至百日。或一歲者。祇以支飲之邪本外實邪也。邪實宜攻。不嫌過峻。主以十棗湯。所謂有病則病當去之也。

按趙程意與徐同。沈鑑意與魏同。朱氏所解。或可備一說。仍表出之。又尤氏曰。其甚者。榮衛過絕。神氣乃亡。爲卒歿矣。否則延久不愈。至一百日。或一歲。則猶有可治。爲其邪未差緩。而正得持也。亦通。

久欬數歲其脈弱者可治。

魏又有久欬數歲。飲之畱伏也久矣。證之成患也深矣。診之



按此亦支飲證。而與苓桂朮甘湯。小半夏湯等證。其機相近者也。

欬家其脈弦。

按據次條。此亦膈間支飲也。又沈氏析此以下九條。題云欬嗽。曰。此與肺脹癰痿之欬嗽不同。而肺脹癰痿。乃陡起之證。此因飲蓄相搏而欬。所以另立一門也。此說似是。然本篇以欬嗽有因水飲者。而連類及之。非爲欬嗽立門也。夫有支飲家。欬煩胸中痛者。

朱氏曰。有支飲家。則支飲之由來舊矣。乃因循失治。病氣變遷。有加無已。始也欬逆。今且壅閉而煩矣。始也倚息不得卧。

稍同其轍。而用五苓散者。亦溫藥和之之意也。

五苓散方

按小島尚質曰。澤瀉一兩一分。當作五分。始合古義。此方傷寒論一以銖兩稱。卻是後人所改。此說確。又

按外臺黃疸引傷寒論作澤瀉五分。益足以徵矣。

按本證無發汗之理。方後多飲煖水汗出愈一句。蓋係于

以傷寒論有此文。而此亦附見者。尤氏說似牽會。

朱氏集驗方。附子五苓散。治翻胃吐食。

大附子一隻。取空。入五苓散在內。炮熟。右爲細末。用薑

湯下。何元壽方。

附方

外臺。茯苓飲。



臨病酌加爲安。

按魏說似是。然赤石脂丸亦梧子大服一九。仍兩存之。

卒嘔吐心下痞。

本草圖經引云。又主嘔噦穀不  
得下。眩悸。小半夏加茯苓湯。

按此亦心下支飲證也。

小半夏加茯苓湯方。

衛生家寶。竹葉湯。治熱吐翻胃。及傷寒遍身發熱冷吐。

於本方加竹葉。

葉氏錄驗方。半夏湯。治肩臂痛。

即本方。

假令瘦人臍下有悸。

按此證。即首條所謂痰飲之類。已。臍下有悸。與腸間漉漉。

外臺文仲療腳氣入心悶絕欲死。

半夏

三兩洗切

生薑

二升半

右二味內半夏煮取一升八

分四服極効。

聖惠治五噎。背膈咽喉不利。痰逆食少方。

半夏七枚。小者湯洗去滑。擣細羅爲散。都爲一服。以濃

小半生薑湯調服之。患年多者。不過三服差。

魏氏家藏方。殊勝湯。去痰涎。進飲食。

於本方加甘草。

防已椒目葶藶大黃丸方。

徐先服一小丸起。尤巧。所謂峻藥緩攻也。魏何云一丸疑誤。



嘔吐小便不利藏府不調惡心頭暈並皆治之

於本方加白茯苓各等分每服半兩重水一盞薑五片

燈心十莖煎八分服

支飲胸滿者

按此條證據尤鑑二說是支飲而兼胃實者故有須于承

氣也

軒義引鑑飲滿即支飲譌

小半夏湯方

趙半夏之味辛其性燥辛可散結燥可勝溼用生薑以制其

悍孫真人云生薑嘔家之聖藥嘔為氣逆不散故用生薑以

散之

病溢飲者。當發其汗。

按二湯證治。徐氏以挾熱伏寒為辨。恐未必是。蓋其別在

從病之輕重。分藥之緊慢。而二方俱不過用以散表水也。

膈間支飲。其人喘滿。

本草圖經引深師作其脈沈緊不愈作乃愈復發下有汗至三日四字无與字

木防已湯方

宋本外臺石膏雞子大十二枚碎綿裹本草引深師木防已二兩石膏二枚雞子大綿裹

木防已加茯苓消湯方

本草无茯苓

澤瀉湯方

聖惠治心下水不散。是胃中痰飲。不能下食。宜服此方。

於本方加半夏生薑。

和劑解暑三白散。治冒暑伏熱。引飲過多。陰陽氣逆。霍亂



分。即古秤之十二銖。今之二釐九豪也。但半夏在別例耳。  
脈沈而弦者。懸飲內痛。

按內痛。諸家無解。豈脇肋內有痛之謂乎。玉機真藏論有  
內痛引肩項文。

十棗湯方

本草圖經載本方云。病懸飲者亦主之。胡洽治水腫及支  
飲。辟飲加大黃甘草并前五物各一兩。棗十枚同煮如法。  
一方又加芩消一兩。湯成下之。  
按聖濟芫花湯原于此方。

醫壘元戎曰。胡洽方治支飲。辟飲於十棗湯中加大黃甘  
草同煎服之。故以相反之劑欲其上下俱去也。

程心下有痰飲。卽支飲也。

病人脈伏。其人欲自利。

按此證亦是心下支飲。而病邪盤結者。與木防已湯。十棗湯證。其機稍近。而其位不均。

甘遂半夏湯方

宋本外臺芍藥一兩。又云三枚。

按趙氏曰。甘草緩甘遂之性。使不急速。徘徊逐其所畱。入蜜亦此意也。此程氏所本。

又按此方四味。都以枚稱。徑長之品。恐難以附子烏頭之枚例之。豈甘遂芍藥亦以如指大准之乎。攷醫心方引小品方云。人參一枚者。以重二分爲准。此似宜以爲率。蓋二



篇曰發汗後飲水多必喘。又曰太陽病小便利者以飲水多必心下悸傷寒例亦論飲水多爲喘。稻葉元熙曰脈雙弦者寒也二句是客。脈偏弦者飲也句是主。主客對舉爲以脈斷病之法。朱氏謂爲衍文者謬。此說爲是。

肺飲不弦。

焦循雕菰集。羅浩醫經餘論序曰。其論金匱以咳則其脈弦。與弦則衛氣不行。如肺飲不弦。肺飲二字句。謂肺飲之輕者有不弦。但短氣而不咳。其弦則衛氣不行而咳矣。則重矣。非謂肺飲無弦脈也。

心下有痰飲。

按病痰二字當作之病爲是。此條亦是支飲之類證。其人振振身潤劇。卽與苓桂朮甘湯之身爲振振搖。真武湯之身潤動。振振欲擗地。其機相同。

夫病人飲水多。必暴喘滿。

朱本亦無喜字。

朱此明飲邪有實有虛。而所致異途。脈亦迥殊也。飲水多二句。是言飲之驟致者。食少飲多四句。是言飲之積漸者。如兩手皆見弦脈。夫弦則爲減。當以正氣虛寒論治。設一手獨弦。明是病氣有偏著。偏著者爲實邪。則又當以攻邪論治矣。皆大下後虛五字。疑屬衍文。節錄

按喘短氣。是支飲所有。悸。是痰飲支飲所俱有。又太陽中



水在腎

腎曰心當作臍

夫心下有留飲

按此支飲之類證已。蓋初非四飲外別有留飲伏飲也。

留飲者。脇下痛引缺盆。

按已亦甚也。輒已。即輒甚。經典中往往有此義。

脇中有留飲。

沈此明支飲甚則變為溢飲矣。蓋留飲乃氣鬱水積。故謂脈

沈者。有留飲也。

膈上病痰滿喘欬吐。

先兄曰滿喘二字疑倒置

魏諸症。皆伏飲內寒。逼陽在外之候。

氏蓋襲此誤。

又按篇中支飲自有二證。其一上迫胸中。其一壅聚心下。其胸中證多實結宜疎蕩。而亦有泛漫宜消導者。其心下證多泛漫宜消導。而亦有實結宜疎蕩者。學者須熟審經旨。勿敢混看焉。

水在心。

先兄曰。堅者。心下堅實也。築者。築築然悸動也。千金可證。短氣者。飲抑往來之氣故也。尤注似迂。

水在肺。

先兄曰。涎沫。卽欬而吐痰也。



注家不知痰之爲淡。又不知其本水搖之謂。而轉爲津液爲病之總稱。故其所解釋。皆與經旨不協矣。此說有理。伊澤信恬亦有說。其意相同。且曰。澹。淡。諸書多相通用。而痰用澹字絕少。但醫心方。引小品云。白微湯。治寒食藥發。胃中澹。外臺作痰。酢于歐煩。又引效驗方云。斷隔丸。治胃間有澹水。竝是淡痰之正字。此言亦是。崧又曰。初月帖。淡悶。與干嘔對言。蓋虛煩之謂。又按懸飲。據巢源。懸字似懸痛之謂。巢源又有懸癖候。曰。欬唾則引脇下懸痛。所以謂之懸癖。然以他三飲例之。則猶宜從前注。爲懸挂之義。爲穩。又成氏注平脈法。沈潛水畜。支飲急弦。曰。畜積於內者。謂之水畜。故脈沈潛。支散於外者。謂之支飲。故脈急弦。程

○痰飲欬嗽病脈證并治第十二

按本篇欬嗽諸條本為懸飲支飲而設。題目中不須

有此二字疑是後人所誤添似宜芟去

問曰。夫飲有四。何也。

按迂元崧曰。四飲云懸。云溢。云支。皆就飲之情狀。而命其

名。皆是虛字。然則淡飲不應特用實字。今據水走腸間一

證攷之。淡者。蓋是水飲搖動之名。淡與澹通。靈樞邪氣藏

府病形篇。心下澹澹。恐人將捕之。說文云。澹。水搖也。从水

詹聲。並可以證焉。

宋玉高唐賦。水淡淡而盤紆。注。淡淡。搖動貌。枚乘七發。紛屯澹澹。又湍流潮波。

又澹。淡之。注。澹。淡。搖蕩貌。馬融長笛賦。頤淡湧流。注。水搖蕩貌。搜神後記。二月中藏始生。有一甲士折食一莖。即覺

心中淡淡欲吐。皆淡澹相通之徵也。以其居四飲之首。故取以題篇目。從來



又脈癥法。左手脈橫。癥在左。右手脈橫。癥在右。脈頭大者在<sub>上</sub>。頭小者在<sub>下</sub>。

又法。橫脈見左。積在右。見右積在左。偏得洪實而滑。亦爲積。弦緊亦爲積。爲寒痺。爲疝痛。內有積不見脈。難治。見一

脈一作脇

相應。爲易治。諸不相應。爲不治。

左手脈大。右手脈小。上病在左脇。下病在左足。右手脈大。左手脈小。上病在右脇。下病在右足。

脈弦而伏者。腹中有癥。不可轉也。必死不治。

脈來細而沈。時直者。身有癰腫。若腹中有伏梁。

脈來小沈而實者。胃中有積聚。不下食。食卽吐。

按聚者為可治。則積之為難治。可推而知。至繫氣。則固屬易治。然恐不得不治自愈矣。

又按十八難。有寸關尺。主胸以上。膈以下。齊以下之言。又載診積聚法。竝與本條相發。空叅。又脈經載診五藏積條。及診法七條。今錄其診法于左。以備對攷。

寸口脈沈而橫者。脇下及腹中有橫積痛。按此素平人氣象論文。其

脈弦。腹中急痛。按此據小建中湯條。腰背痛相引。腹中有寒疝。脈

弦緊而微細者。癥也。夫寒痺癥瘕積聚之脈。皆弦緊。若在

心下。即寸弦緊。在胃管。即關弦緊。在臍下。即尺弦緊。一曰關脈。

弦長。有積在臍左右上下也。



朱凡陰寒凝結。由漸而成者。俱謂之積。故曰諸積非有一例之證象也。但有一定沈細之脈象。故知其為積也。病氣深沈。不可不分上中下三焦以處之。脈亦必從寸關尺三部以候之。如寸口主上焦。脈細而附骨。知其積在胸中。如胸痺之類是也。出寸口上竟上也。主積在喉中。如痰氣相搏。咽中如有炙臠等是也。關上主中焦。關脈細沈。主積在臍旁。按原文作關部主中焦。而關有三候。關中主積在臍旁。如遶臍腹痛之類是也。微云云。殊屬無稽。今按經文改訂。上關上。積在心下。如胃寒脘痛之類是也。微下關。積在少腹。如少腹寒痛之類是也。尺候下焦。尺脈細沈。積在氣衝。如陰寒疝症之類是也。

錯蓋言小腸有寒。故泌別不職。而水糞雜下。其有熱者。腸垢被迫而下出也。大腸有寒。則陽氣下墜。故下重。便血。其有熱者。毒結肛門。故為痔也。注家順文解釋。竟不免強湊。今大小易置。其義始瞭。但脈經以來諸書。皆與今本同。則姑記所疑。以俟有道論定已。

李中梓病機沙篆曰。仲景云。小腸有寒。其人下重。便血。以乾薑燒黑存性。磁碗合放冷地上。為末。每服一錢。米飲調下。神效。

問曰。病有積。有聚。有繫氣。何謂也。

脈經。繫氣。並作繫氣。為繫氣。下有夫病已愈。不得復發。今

病復發。即為繫氣也。十七字。乃積也。下有細一作結注文。朱氏亦以諸積以下為別條。



者營氣不逮。營衛不能相將。三焦無所仰。不歸其部。上焦不歸者。噫而吞酢。按平脈法作酢吞。中焦不歸者。不能消穀引食。下焦不歸者。則遺溺。正此之謂。

按魏氏曰。師又言不須治。久則愈者。非聽其洩脫。不為援救也。言不須治其下焦。但理其中焦可也。朱氏曰。便溺雖屬下焦。而實中焦氣紊所致也。故曰不須治。久則愈。謂不須治下焦。但調理脾胃。久當自愈耳。二說欠穩。亦姑存之。師曰。熱在上焦者。因欬為肺痿。

按小腸受胃中水穀。而分利清濁。大腸居小腸之下。主出糟粕。而其下口為肛門。因疑此條大腸小腸。係于傳寫互

相去不遠。至寒中腎。卽是直中。當不越厥逆下利。欲吐不吐諸條。

餘述本篇所謂中風中寒。與傷寒中之中風中寒不同。亦與半身不遂之中風自異。如內經五藏風。稍似相近。而其證未必契合。則知此別是一義。不宜彼此牽湊。且其於風與寒之旨。注家不敢辨晰。殊無可徵驗。姑闕其疑已。徐氏諸輩。於脾腎二藏。補出其遺。又於肝著脾約腎著三方。特論其趣。要皆不免臆度也。

問曰。三焦竭部。

趙嘗攷傷寒論。脈法中云。寸口脈微而瀯。微者衛氣不行。瀯



金匱要略卷中  
骨節離解。緩弱不收。或入浴暈倒。口眼喎邪。手足羶曳。皆  
溼溫類也。

於本方。去甘草。加附子。澤瀉。桂心。

又苓朮湯。治脾胃感風。飧泄注下。腸鳴腹滿。四肢重滯。云

於本方。加厚朴。青皮。半夏。草果。

宣明論。腎著湯。治胞痹。小便不利。鼻出清涕者。即本方

腎藏。淳之堅。

徐氏曰。腎藏風寒皆缺。然觀千金三黃湯。用獨活細辛。治  
中風及腎者。而敘病狀曰。煩熱心亂惡寒。終日不欲飲食。  
又敘腎中風曰。踞坐腰痛。則知金匱所缺。腎風內動之證。

翁有熱義。此說是。

邪哭使魂魄不安者。

朱氏曰。哭字疑誤。陽氣衰。陰氣衰。衰字當作病字。解此說謬。

脾中風者。

按李氏皮目解。係臆說。輯義過存之。當刪。

徐氏曰。金匱缺脾中寒。然不過如自利腹痛。腹脹不食。可類推也。

甘草乾薑茯苓白朮湯方

聖惠。治腎著之爲病。身體冷。從腰已下痛重。甘草散方。

於本方。加當歸。

三因。苓朮湯。治冒暑遭雨。暑溼鬱發。四肢不仁。半身不遂。



涕。謂吐粘痰也。據此。則濁涕。卽是粘痰。非鼻涕之謂也。  
肺死臟。

先兄曰。此卽浮乳之脈。

肝死臟。

先兄曰。此云浮之弱。尤氏以爲其勁直則一也。不知何意。  
心中風者。

按徐氏曰。飢者。火嘈也。食卽嘔吐。邪熱不殺穀也。尤氏曰。  
心中飢。食則嘔者。火亂於中。而熱格於上也。二說似是。又  
徐氏翕翕解未確。弟子邨田精一曰。文選。張平子思玄賦。  
溫風翕其增熱兮。注。良曰。翕。熱息。衡曰。說文曰。翕。熾也。是

金匱玉函要略述義卷中

丹波元堅學

○五臟風寒積聚病脈證并治第十一

論二首

脈證十七條

方二首

此三字輯義偶脫

肺中風者

冒而腫脹輯義腫瀕作腹諸本皆作腫字

肺中寒

按評熱病論曰。勞風法在肺下。其為病也。使人強上冥視。

唾出若涕。又曰。巨陽引精者三日。中年者五日。不精者七

日。欬出青黃涕。其狀如膿。大如彈丸。從口中若鼻中出。欬

論久欬下曰。使人多涕唾。先教諭曰。古無痰字。云唾出如







金匱要畧述義

下







WBC T156k 1854 v.1



（The main body of the page contains multiple vertical columns of text, which are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized into approximately 12 columns, separated by thin vertical lines. The characters are too light to be transcribed accurately.)

氣證乎。○按此說似精。然尺中既微。何能兼大。故張氏於微脈。則略而不論。殊屬模糊。但其云瀯非瀯弱無力之謂者。是矣。然則微亦沈滯不起之微。非微弱之謂也。

下利不欲食者。

俞本趙本欲作飲誤

宿食在上脘。當吐之。

周食既云宿。決非上脘。既非上脘。何以用吐。今言上脘。又言宿食。則必有痰載物。不使得下。則爲喘爲滿。不言具見。故一吐而痰與食俱出矣。

金匱玉函要略述義卷上

終



寒家二條。卽素稟陰臟。外寒易觸者也。蓋此三等。旣非腹滿。亦不寒疝。但以其屬寒。仍牽聯及之。且以與腹滿寒疝。互相發明者已。其脈數而緊一條。卽係寒實諸證之診。以爲總結矣。然則二十條者。學者宜區類而看。如前注家。往往湊合爲說。殆不免強會也。

問曰。人病有宿食。何以別之。

故下原本有知字。宜補。

傷寒續論曰。所謂亦微而滿。亦字從上貫下。言浮大而按之略滿。非瀯弱無力之謂。見浮大<sub>下</sub>中。按之略滿。方可用大承氣<sub>中</sub>下之。設純見微滿。按之不實。乃屬胃氣虛寒。冷食停滯之候。又當從枳實理中。助胃消導之藥矣。豈復爲大承

去皮。右以熟水研服之。當快利三兩行。卽以漿水粥止。  
立定。

餘述按本篇先敘腹滿。如痛者爲實條。厚朴七物湯。厚朴  
三物湯。大柴胡湯。大承氣湯四條。此其屬熱實者也。如首  
條。與腹滿時減復如故條。此其屬寒實者也。次敘寒疝。如  
腹痛脈弦而緊條。與大烏頭煎。當歸生薑羊肉湯。烏頭桂  
枝湯條。皆以寒疝目之矣。如瘦人繞臍痛。與附子粳米湯。  
大建中湯條。亦是寒疝已。其他諸條。如寸口脈弦者。卽脇  
下拘急而痛。與大黃附子湯證。卽虛寒從下上。此寒氣聚  
著臍脇者也。如病者痿黃證。其位雖異。亦是寒實也。如中



減五六合。內湯中兩三沸。去滓。服一合。日三。間食。彊人三合。以如醉狀為知。不知漸增。忌海藻、菰菜、豬肉、冷水、生葱。深師同。

外臺柴胡桂枝湯。

宋本外臺作療寒疝腹中痛者。

醫心方。范汪方。治寒疝腹中痛。小柴胡湯。即原方。

外臺走馬湯。

肘後。若唯腹大。動搖水聲。皮膚黑。名曰水蠱。巴豆九十枚。去皮心。杏仁六十枚。去皮尖。並熬令黃。搗和之。服如小豆大一枚。以水下為度。勿飲酒佳。

聖惠。治乾霍亂。不吐不利。煩悶不知所為方。巴豆一枚。

按魏氏以此條脈為寒疝寒熱雜合之候其說似精猶不  
如尤氏以為寒疝陰盛之為優然此條該寒實諸證而為  
結蓋不特言寒疝也

附方

外臺烏頭湯

按此方千金外臺所載竝與前方文有異蓋本是別方  
林億等以前有五味方省之不錄也今從外臺拈出于

左曰烏頭

十五枚炮○按千金云要略五枚

芍藥

四兩

大棗十枚

擘

生薑

一斤○按千金作老薑

桂心

六兩

右六味切

以水七升煮五

味取三升去滓別取烏頭去皮四破蜜二升微火煎令



湯詳出後所私攬。注家皆仍原文為說。覺未當。周氏意似單桂汁然語意

不了。且其解欠妥。仍不錄。又按外臺於此方後。注云。范汪方同。今檢宋本。大書作范汪方云。而直接桂枝湯。仍知其舉桂枝湯者。是范汪方文。而非出仲景也。

聖惠治寒疝腹中痛。手足逆冷。身體疼痛。針灸諸藥。所不

能任者。宜服烏頭散方。川烏頭。大者十枚桂枝。二兩石臼藥。擣細

羅為散。每服二錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至五分。次

入蜜半合。更煎三兩沸。令熟。每於食前和滓溫服之。

聖濟治心腹卒脹痛。桂心丸。桂二兩。烏頭一兩。為末。鍊蜜

和丸。

其脈數而緊乃弦。

二十九如梧子。永除。又法。用煎烏頭蜜汁。以桂枝湯五合解之。飲三合。不知加五合。其知者如醉。以為中病。

寒疝腹中痛。逆冷手足不仁。

按烏頭煎證。寒氣專盛于裏。此條證。表裏俱寒壅。是所以有須于桂枝。灸刺諸藥不能治。是言病勢之劇。套法不能得治。不言灸刺諸藥之誤措。徐氏以為是或攻其內。或攻外。邪氣牽制不服。似欠穩貼。輯義徐注為陽所容。容字宜作容字。

烏頭桂枝湯方

宋本外臺秋烏頭實中大者。十枚。去皮。生用。一方五枚。

按此方證。最屬急劇。治以單捷為妙。桂枝湯外臺引作單桂汁。蓋仲景舊面。其出五味方者。疑後人誤據千金烏頭



不可一日再服。作日  
止一服。不可再也。

按程氏曰。治下焦之藥。味不宜多。多則氣不專。此言本于  
至真要大論。補下治下制以急之說。殆不免拘泥。

又按陶氏本草序例曰。附子烏頭若干枚者。去皮畢。以半  
兩準一枚。千金方。治風歷節。防已湯方後曰。凡用烏頭。皆  
去皮。熬令黑。乃堪用。不然至毒。入宜慎之。據此。宋本外臺。  
不必是。其不咬咀。豈嫌熟爛相和乎。

本草圖經云。崔氏治寒疝心腹脅引痛。諸藥不可近者。蜜  
煎烏頭主之。以烏頭五枚大者。去芒角及皮。四破。以白蜜  
一斤。煎令透潤。取出焙乾。搗篩。又以熟蜜丸。冷鹽湯吞下。

為溫利之用。如附子瀉心湯。則其證表寒裏熱。故別煮附子。而功則各奏。故同是附子大黃併用。而立方之趣。迥乎不均。徐氏說未確切。蓋溫利之劑。實以桂枝加大黃湯。及此湯為祖。而溫脾等諸湯。皆莫不胚胎于此二方矣。

赤九方

按本草。丹砂黑字云。作末名真朱。

寒山遶臍痛。

沈緊類聚亦作沈弦。

按素問經脈別論。真虛痛心。厥氣畱薄。發為白汗。

陰陽別論。魄汗。

輯義誤寫作白汗。又生氣通天論。魄汗未盡。魄白音通。

烏頭煎方

宋本外臺。熬作炮。無去皮字。白蜜二斤。方後。右以水三升。煮烏頭取二升。去烏頭。內蜜煎。令水氣盡云云。



腹滿不減。

傷寒補亡論曰。減不足言者。言不甚減也。論言。太陽發汗不徹。不足言。與此同意。俗語所謂不濟事者是也。

心胸中大寒痛。

按出見有頭足上下。句上。上聲。下。去聲。尤氏以出見有頭

足。爲陰凝成象。腹中蟲物。乘之而動。謂蜀椒乾薑溫中下

蟲。誤甚。

大建中湯方

蜀椒去汗。類聚無去字。

大黃附子湯方

按此條證。固屬寒實。故大黃附辛。相合成劑。性味融和。自

附子粳米湯方

按弟子邨田精一曰。此方與白虎湯。及加入參加桂二湯。桃花湯。並用粳米。而其煮法。不云至幾升。蓋是以米熟爲度。不必期至幾升者。恐非有脫文。厚朴麻黃湯。煮小麥熟去滓。亦是一轍。此可以備一說。仍存之。

聖惠治寒疝心痛如刺。繞臍腹中盡痛。白汗出。氣欲絕方。

於本方加川椒。乾薑。桂心。

厚朴三物湯方

本草厚朴條圖經云。張仲景治雜病。厚朴三物湯。主腹脹脈數。厚朴半斤。方後有腹中轉動。更

服。不動勿服。十字。

大柴胡湯方

黃芩二兩。原本諸本並作三兩。



寸口脈弦者。

巢源作寸口脈雙弦則脇下拘急其人瀉瀉而寒。

夫中寒家喜欠。

按中字。金鑑爲平聲讀。其他諸注皆爲去聲讀。蓋此中寒家言素稟陰臟動易感寒者。然則二說併存爲佳。又程氏謂寒鬱於肺經而爲熱者。似欠穩當。靈口問篇曰。陽引而上。陰引而下。陰陽相引。故數欠。又曰。陽氣和利。滿於心出於鼻。故爲嚏。辨脈法曰。客氣內入。嚏而出之。

病腹滿發熱十日。

本草厚朴條圖經引云。又厚朴七物湯主腹痛脹滿。按此與千金同誤。

按金鑑曰。飲食如故。胃熱能消穀也。存攷。

厚朴七物湯方

圖經引枳實上有大字。桂枝之枝字无。

外實。病淺故也。重手按之則快。爲內虛。病深故也。重手按之則痛。爲內實。病深故也。輕手按之則快。爲外虛。病淺故也。凡人病按之則痛者。皆爲實。按之則快者。皆爲虛也。難經本爲有痛者立言。而玄操注亦與此條相發。

又按陽明篇曰。陽明病。脅下鞕滿。不大便而嘔。舌上白胎者。可與小柴胡湯。其意正與本條互發。以見證雖似可下。其白胎者。邪未結實。黃胎者。始爲熱實。乃黑胎之爲實。可以知也。且此條示以按腹知虛實。以驗舌辨寒熱。而後宜議攻下矣。要之診察之大法。莫不可從此條而擴充焉。

病者痿黃。

脈經胸中作胃中利上有下字



類併及者歟。

○腹滿寒疝宿食病脈證治第十

趺陽脈微弦。法當腹滿。

按此條證。寒氣壅閉。即大黃附子湯所主。宜稱之實而言。

為虛寒者。虛猶虛煩之虛。非虛衰之虛。蓋指無形之寒氣。

對水飲結聚有形之寒而言也。

虛煩義。宜參傷寒論述義。梔子豉湯條。

又程

氏注稍不了。

病者腹滿。按之不痛為虛。

按四十八難曰。癢者為虛。痛者為實。外痛內快。為外實內

虛。內痛外快。為內實外虛。楊玄操注曰。輕手按之則痛。為

懊痛候。千金養胎篇。有腹滿懸急。心下懸急之文。亦竝懸

牽通用之徵也。斯說為覈。三國志管輅傳。有心中縣痛文。

九痛丸方

原本諸本附子三兩下有炮字。

餘述本篇題云胸痺心痛。而首條則二證併論。其他諸條。

皆為胸痺立方。

括樓薤白半夏湯。心痛徹背。不過言心胃痛甚。挂枝生薑枳實湯。心中痞。前注猶以

為胃

痺。心痛則僅烏頭赤石脂丸一方已。故二證之辨難就

而可攷。以臆測之。胸痺其痛頗泛。心痛其痛殊緊。胸痺則

病淺。心痛則病深。蓋二證中。要自有輕重之別。而其實似

無太異同。故胃痺之方。足以治心痛。至真心痛。則固屬不

治。仲景略而不言。殆以此也。短氣一證。病屬上焦。故亦連



此緩急。主在急字。非或緩或急之謂。史記倉公傳。緩急無可使者。袁盎傳。一旦有緩急。寧足恃乎。游俠傳。且緩急人之所時有也。俱是係于一時切迫之謂。此足以證焉。

焦循雕菰集。羅浩醫經餘論序曰。其論本草。以神農經為主。而證以南陽之方。以蕙苴主筋急拘攣。故金匱胸痺緩急者主之。用以健脾利溼。則失其義。

心中痞。諸逆心懸痛。

輯義。肘後痛下有五字。當作肘後作三字。

按諸逆。程氏以病證言。尤氏以病因言。二說俱通。魏氏曰。諸逆兼有形無形之邪為言。與尤意同。伊澤信恬曰。懸牽音義相同。懸痛謂牽急而痛。肘後可證。又巢源有心懸急。

橘皮枳實生薑湯方

聖濟治風寒客於肝經。膈腕痞塞。脇下拘痛。常欲蹈其胸<sub>上</sub>。名肝著。蹈胸湯方。

於本方加桔梗甘草薤白。

胸痺緩急者。

本草圖經引緩上有偏字。原本諸本並無入字。

周胸痺緩急者。痺之急證也。寒飲上聚心膈。使陽氣不達。危急為何如乎。故取薤白逐水為君。附子之辛熱為佐。驅除寒結。席卷而下。又烏不勝任而愉快耶。

按周說似是。故人之用。能托鬱結。況附子之雄烈。相合為散。比之前款諸方。其力最峻。足以奏功于然眉之際焉。蓋



御藥院方。枳實理中丸。治證與本條同。

於理中丸中。加枳實。茯苓。附子。

按外臺。崔氏。療時行四五日。大下後。或不下。皆患心中結滿。兩脅痞塞。胃中氣急。厥逆欲絕。心胃高起。手不得近。思

與增損理中丸。

於本方中。加括樓根。枳實。茯苓。牡蠣。

正師胸痺人參湯之意。

其效甚著。而王好古許國禎。則移崔氏之方。以治本證。亦善於變通者矣。

茯苓。杏仁。甘草湯方。

瞿心方。瞿門方。治胃中痞塞。短氣膈膈者。或腹急痛方。

於本方。加半夏。生薑。若氣不下。加大黃。檳榔。取利為差。

栝樓薤白白酒湯方

按先兄曰。說文曰。載。酢漿也。从酉。戔聲。鄭玄注。周禮四飲。

曰。漿。今之載漿也。陳藏器曰。醋。破結氣。心中酸水。痰飲。

胸痺。心中痞氣。

本草枳實條。圖經引。與外臺相同。類聚與趙本同。

枳實薤白桂枝湯方

圖經引。无枝字。

人參湯方

人參條。圖經引。作治中湯。白朮之白字。无。未附。加減法。一與傷寒論同。仍不錄。

聖濟總錄曰。胸痺之病。其脈陽微而陰弦。陽虛則知在上。

焦。陰弦故令胸痺心痛。古方用理中湯。取緩其中氣。

陰證略例。理中湯方後曰。若胃痺脇下妨悶者。加枳實半

兩。茯苓半兩。



胸痹之病。喘息欬唾。

徐此段實註胸痹之證脈。後凡言胸痹。皆當以此概之。但微有參差不同。故特首揭以爲胸痹之主證。主脈主方耳。周寒濁之邪。滯於上焦。則阻其上下往來之氣。塞其前後陰陽之位。遂令爲喘息。爲欬爲痛。爲短氣也。陰寒凝泣。陽氣不復自舒。故沈遲見於寸口。理自然也。乃小緊數。復顯於關上者。何耶。邪之所聚。自見小緊。而陰寒所積。正足以遏抑陽氣。故反形數。然陽遏則從而通之。括萐實最足開結豁痰。得薤白白酒佐之。旣辛散而復下達。則所痹之陽自通矣。

按周說爲當。但解數脈未免牽強姑存之。

桂枝加桂湯方

傷寒論本方後曰。本云桂枝湯。今加桂滿五兩。所以加桂者。以能泄奔豚氣也。

發汗後。臍下悸者。

茯苓下。輯義。桂枝二字偶脫。

餘述奔豚一證。多因水寒上冲。故治法不出降逆散寒。而注家概解以腎邪。殆不免牽湊。要坐不檢難經仲景之有異耳。

○胸痹心痛短氣病脈證治第九

師曰。夫脈當取太過不及。

按責。讀如平脈法。肥人責浮。瘦人責沈之責。即求責之義。



師曰。病有奔豚。有吐膿。師曰奔豚病以下。脈經爲別條。宜從。

按欲死二字。形容苦惱之狀而言。與少陰篇吳茱萸湯條

同語例。

奔豚湯方

按此方證。挾有熱邪。故不取桂枝之溫。而用黃芩生葛之涼。且既有半夏。故不再用茯苓。芎歸芍藥三味。以和其腹痛也。

傷寒總病論。動氣在上。不可發汗。發汗則氣上衝。正在心端。李根湯主之。

於本方。去芎藭。生葛。加桂枝。人參。茯苓。

結聚破潰膿血。最為好。腹腎脾內癰湯要藥。本草以為  
冬瓜。但用蒂不云子也。又今腸癰湯中之用。俗人或用  
冬瓜子。非也。又案諸本草。單云瓜子。或云甘瓜子。今此  
本誤作白字。當改從甘也。原本膿作濃。藥作樂。今從證類本草改。此說可  
以確瓜瓣之為甜瓜矣。

醫心方。張仲景方。治卅年效。大棗丸方。

大棗百枚

核去

杏仁百枚

熬

豉百升枚

凡三物。豉。

杏仁。搗令相得。乃內棗。搗令熟和調。丸如棗核。一九含之。

稍咽汁。日二。漸增之良。

按此疑雜病論之遺方。仍附于此。

○奔豚氣病脈證治第八



千金桂枝去芍藥加皂莢湯。

按此方桂枝去芍藥湯。桂枝甘草湯之意。取之扶胸中陽氣。不和調營衛。蓋亦屬肺冷之痿。

外臺桔梗白散。

按此條與桔梗湯證一而方異。蓋所傳之本不同也。然肺癰其膿稍成。正氣隨衰。峻猛之劑。恐不能堪。王氏所據。豈得無錯乎。

千金葦莖湯。

按此方主證。蓋在虛實之間。

又按蘇敬新修本草白瓜條曰。別錄云。甘瓜子。主腹內

外臺炙甘草湯。外臺桂枝二兩阿膠三兩炙大麻子人半升大棗四十枚擘餘同方後云右九味切以美酒七升水八升相和先煮八物取四升絞去滓內膠上微火烱銷溫服七合日三夜一

按此方施之泛泛惡心者必增嘔逆溫溫液液蓋別有義未敢又此方證與麥門冬湯證相近俱係滋養上焦之劑。

千金甘草湯。

按傷寒類要以單甘草湯治炙甘草湯證其理一致。

千金生薑甘草湯。

按此方亦治肺冷而萎猶是甘草乾薑湯之變方沈氏說欠當又而渴當作不渴為安。



當大病。彼土古時之品。則恐不如此也。

聖濟治肺癰涕唾涎沫吐膿如粥。麥門冬湯方。

於本方加麥門冬。青蒿心葉。

小青龍加石膏湯方

按麻杏甘石湯。厚朴麻黃湯。越婢加半夏湯。小青龍加石

膏湯。皆麻黃石膏同用。麻黃發陽。石膏逐水。二味相藉。而

驅飲之力要峻。不必取之于發表清熱。蓋此四方。緊慢稍

異。而其旨趣。則大約相均。要在臨證之際。隨其劇易。以爲

審處耳。

附方

於本方加杏人各搗摠和合平旦空腹服八九云云

幼幼新書簡要濟衆治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小僂

赤澀方

葶藶子半兩以棗肉和搗爲丸

施圓端效方名散腫丸

雞峰普濟方曰著作雷道矩病吐痰頃間已及升餘欬不

甚面色黯鬱精神不快兆告曰肺中有痰胃膈不利令服

仲景葶藶大棗湯一服訖已覺胸中快利略無痰唾矣

桔梗湯方

原注血痺當喉痺然要是後人所續加

按排膿散用枳實芍藥桔梗排膿湯於本方加生薑大棗是知桔梗有排膿之功但此間所有氣味輕淡不足以抵



金匱要略卷之十一  
按葶藶下水疎肺壅。故的治肺癰膿未成者也。金鑑所引

二注本係于周氏補注

醫心方引范汪方云。亭歷熬令紫色。治令自丸。丸如彈丸。大棗廿枚。以水二升煮棗。令得一升半。去棗。內藥一丸。復煎得一升。盡服之。出支飲下本草圖經引亦作大棗二十枚。

按葶藶以彈丸爲率。故不須舉兩數。大棗諸書皆作二十枚。本經疑是錯寫。或曰葶藶搗之則粘膩。足以自丸。不必補末蜜二字。

外臺必效。療天行病後。因食酒麪。肺中熱擁。遂成欬不止。於本方加桑白皮。桔梗。麻黃。

又崔氏。療大腹水病。身體腫上氣。小便澀赤。云云。

五合。未必爲多。豈東垣所謂在上者不厭頻而少之謂乎。

大逆上氣。咽喉不利。

外臺無者字。宜從。

麥門冬湯方

稻葉元熙曰。煎法。据竹葉石膏湯。溫服上。恐脫去。滓內粳米。煮米熟。湯成去米十二字。

外臺。崔氏療骨蒸。唇乾口燥。欲得飲水止渴。竹葉飲方。

於本方。去人參。加竹葉。生薑。

又深師。療肺氣不足。逆滿上氣。咽喉中閉塞短氣。寒從背起。口中如含霜雪。語言失聲。甚者吐血。補肺湯方。

於本方。去人參。半夏。加五味子。乾薑。欵冬花。桂心。桑根

白皮。

肺癰喘不得卧。



去桂枝。以厚朴降逆爲君。其佐用杏人。亦猶桂枝加厚朴杏子湯之例。況配以石膏。其驅飲之力更峻。

澤漆湯方

千金五合下。有日三夜一四字。无至夜盡字。本草圖經引五合下。有日三二字。盡上有服字。

按澤漆。本草白字。稱味苦微寒。主大腹水氣。四肢面目浮腫。黑字。稱利大小腸。蓋此方主證。水飲內結。故有須于利水之品也。

又按陳藏器曰。千里水。及東流水。味平無毒。主病後虛弱。然則此方所用。在熟淡不助內飲已。又煮取五升。溫服五合。至夜盡。是一日十服。他方莫有此例。千金似是。然古之五升。卽今之五合。古之五合。卽今之五勺。以今推之。日服

風涎潮。救急稀涎散。蓋胚胎于此方。

千金。治欬嗽胸脅支滿。多唾上氣方。

白糖

五分

皂莢

末一方寸匕

右二味

先微暖糖令消。內皂

莢末。合和相得。丸如小豆。先食服二丸。

欬而脈浮者。

按水飲上迫。脈必帶浮。不必拘表證有無。此二方證。均是上焦蓄飲。而以脈浮沈為別者。蓋以勢之劇易。及水飲上迫。與內結之異耳。注家特就邪為分。殆非通論。

厚朴麻黃湯方

按此方證。係寒飲迫肺。而無風寒外候。故於小青龍湯中。



按本篇用麻黃者四方。宜爲二義看。注家皆謂其證內飲挾外邪。故用麻黃發其表。是一義。今驗肺脹證。多是宿飲爲時令觸動者。而不必具表候。則其用麻黃。適取發泄肺中鬱飲。亦猶麻杏甘石湯之意。是一義。蓋勿拘一隅可也。欬逆上氣。時時唾濁。

按會世榮活幼心書曰。肺爲五藏華蓋。卧開而坐合。所以卧則氣促。坐則但寬。蓋但坐不得眠。得斯說而其理明矣。

皂莢丸方

本草圖經云。張仲景治雜病方。欬逆上氣。唾濁。得和政但坐不得眠。皂莢丸主之。皂莢杵末。一物以蜜丸。大

如梧子。以棗膏和湯服。二九。日三夜一服。

按本草皂莢條黑字云。除欬嗽囊結。又有孫尚藥治卒中

又按脈經平肺痿肺癰中所載。出于本經之外者。凡六條。俱似非仲景原文。姑拈一條于左。曰。問曰。振寒發熱。寸口脈滑而數。其人飲食起居如故。此爲癰腫病。醫反不知。而以傷寒治之。應不愈也。何以知有膿。膿之所在。何以別知其處。師曰。假令膿在胸中者。爲肺癰。其人脈數。欬唾有膿血。設膿未成。其脈自緊數。緊去但數。膿爲已成也。肺痿吐涎沫而不欬者。

按稻葉元熙曰。若服湯已渴者。屬消渴。是假設之辭。與吳茱萸湯條得湯反劇者。屬上焦也同例。

射干麻黃湯方



間有可愈者。亦須肺未穿。故可救。但肺痿罕有安者。蓋其肺枯竭乾燥。何由而得潤。所以難愈。

問曰。病欬逆。何以知此爲肺癰。

風則之則原本無之。輯義偶衍。宜刪。

按此條。列呼吸不利。欬口乾等候。就風與熱。以爲分別。然大旨不過云風壅釀熱。以爲此病耳。

又按熱過於榮。熱之所過。兩過字。注未了。當讀如詩江有汜。不我過之過。史記淮陰侯傳。信常過樊將軍噲。魏其侯傳。灌夫有服。過丞相。扁鵲傳。舍客長桑君過之類。亦是。又呂覽異寶。五員過於吳。注。過猶至也。義殆相同。辨脈法曰。熱之所過。則爲癰膿。

形之氣。氣傷宜徐理。徐氏沈氏周氏朱氏皆從此說。然肺痿之病。必損血液。則以氣血立辨者。謬矣。

又按口中反有濁唾涎沫。蓋係于該言稠痰白沫者。本經所謂痰者。非今之所謂痰。次條曰。多唾濁沫。皂莢丸條曰。

時時唾濁。桔梗湯條曰。時出濁唾。五藏風寒篇曰。肺中風。

吐濁涕之類。皆今之稠痰也。蓋肺萎液燥。而口中有唾涎。

故下反字也。巢源虛勞凝唾候曰。腎液為唾。上焦生熱。熱衝咽喉。故唾凝結也。此亦稠痰耳。又脈

反滑數。反字難解。稻葉元熙曰。反于肺痿。亡津液之脈。或

是。

仁存孫氏方曰。詳觀肺癰肺痿二證。實難治。要之肺癰則



是上盛下虛。其用此湯。亦取于和陽就陰。顧脫氣一條。猶係于陰虛陽隨衰者。酸棗湯。治火亢虛煩。心神不寧者。然則謂仲景所云虛勞者。皆屬陰虛可乎。如大黃蠱蟲丸證。即骨蒸之類。而肺痿一證。是勞嗽之謂。則今之虛損勞瘵者。實不外于仲景所舉之數件矣。愚撰藥治通義。於補法下。以建中腎氣二證。對待為辨。然今更攷之。其方則為補陽補陰之分。而其證則不必胃虛腎虛之別。舊見不免謬。

○肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七

論三首

脈證四條

三字四字並譌空訂

方十五首

五當作六

問曰。熱在上焦者。因欬為肺痿。

脈經千金又作數

按喻氏曰。肺癰屬在有形之血。血結空驟攻。肺痿屬在無

九未詳其方當攷。

餘述魏氏曰。失精于下者。可成虛勞矣。脫氣則成虛勞于上者焉。秦越人之論虛損。其言陽虛而陰盛。損則自上而下。一損損于肺。二損損于心。三損損于胃。卽仲景所謂脫氣之虛勞也。其言陰虛而陽盛。損則自下而上。一損損于腎。二損損于肝。三損損于脾。卽仲景所言失精之虛勞也。右節文念庭之說是也。蓋五勞六極七傷。其目雖殊。要其指歸。不出于陽虛陰虛二端。且不啻不出于此二端。而陰虛陽亢者。實爲居多。今篇首旣冠以男子二字。而細檢各條。大抵莫不屬陰虛矣。小建中湯。扶脾之劑也。而其證則亦



肘後。獺肝散。

朱獺爲陰邪之獸。而肝獨應月增減。是得太陰之正氣。其性獨溫。故宜于冷勞。又主鬼疰一門相染者。以陰入陰。以邪逐邪。同氣相求之義也。

按本草。圖經云。張仲景有治冷勞獺肝丸方。又主鬼疰一門相染者。取肝一具。火炙之。水服方寸匕。日再。崔氏治九十種蠱疰。云云獺肝丸二方俱妙。又聖惠方載冷勞證。文錄不錄。

又按本草猪條。圖經云。吐主骨蒸熱勞。血脈不行。補羸助氣。四季宜食。張仲景有猪肚黃連丸。是也。猪肚黃連

用清酒。併以扶護元陽。勿宣達諸藥之力。與腎氣丸之桂附。救腎中之陽。其趣似異而實同。如後世滋陰諸方。徒哀合羣隊涼潤之品。誠非知制方之旨者矣。徐氏曰。後人只喜用膠麥等。而畏薑桂。豈知陰凝燥氣。非陽不能化耶。此言得之。

又按地黃。此方。及大黃蠱蟲丸。腎氣丸等。比之他藥。分兩殊多。蓋以體重之故。不必君藥之謂。空參藥治通義方劑分量下

小兒衛生總微論。國老丸。治瘦瘠虛羸。愒愒少氣。右以甘草炙焦黃。杵末。煉蜜和。丸棗豆大。每服五丸。溫水下。日三服。一歲兒五丸。已上者七八丸。以意加減。無時。



幼幼新書。嬰孺。治小兒身體面目悉黃。此是榮衛氣伏熱於內所爲。蟬螬丸方。

於本方。去大黃。桃人。乾漆。加大棗。按此證猶用本方爲佳。

附方

千金翼。炙甘草湯。宜參肺痿附方。

按此方。仲景滋陰之正方。而千金翼文。出於仲景。必有其徵。故宋人取附于此也。醫學入門。稱一切滋補之劑。皆自此方而變化之者。其言爲當。蓋此方。炙甘爲君。生薑。大棗。爲臣。地黃。麻人。阿膠。麥門。爲佐。專以滋陰潤燥爲務。然懼其粘膩涼溼。不利中土。故人參桂枝爲使。更

攻而攻之。則厥疾可愈。魏氏曰。此在婦人女子。寡婦女尼。因不月漸成虛勞者。尤所宜投也。

大黃蠱蟲丸方

大黃十分。空作二兩十二銖。黃芩一兩。諸本作二兩。

按本草經。蟬蛸味鹹微溫。主惡血。血瘀痺氣。破折血在脅。

下堅滿痛。月閉。圖經云。張仲景治雜病方。大蠱蟲丸。

按黃字脫。

中用蟬蛸。以其主脅下堅滿也。又蠱蟲條。圖經云。張仲景

治雜病方。主久瘕積結。有大黃蠱蟲丸。又大驚甲丸中。并

治婦人藥。並用蠱蟲。以其有破堅積下血之功也。

醫學綱目曰。結在內者。手足脈必相失。宜此方。然必兼大

補劑瓊玉膏之類服之。



極。更有肌膚甲錯。兩目黯黑。二證俱為乾血之徵。蓋其脈數蒸熱。亦可概知也。

又按五勞。言五藏勞。蓋憂傷。勞傷。以勞心肝。食傷。飲傷。飢

傷。以勞脾。房室傷。以勞腎。而諸勞之極。又必勞肺。且此條

所言。不是五勞兼備者。蓋言有一所傷。而勞一藏。以致經

絡營衛氣傷。遂為此病。輯義引巢源思勞。爾雅。楷。敲。注。謂

木皮甲錯。輯義引山海經。文有譌脫。曰。藏羊。又十四難。損

其肝者。緩其中。滑氏曰。緩者和也。百勞九。原出醫壘元戎。曰。許州陳大夫傳。張仲

景百勞九。緩中補虛。程注甚當。張說非是。

程氏曰。婦人虛勞。大半內有乾血。男子亦間有之。審其可

煩心不得眠。補中益肝氣。又茯苓之功。本草經稱主驚邪。恐悸。孫真人曰。治心煩悶。及心虛驚悸。安定精神。蓋以其質重。亦能鎮縊。此方所取。正在于此。聖惠治虛勞煩熱。不得眠卧。黃芩散。

於本方。去芎藭。加黃芩。羚羊角屑。

五勞虛極。羸瘦腹滿。

按此條證。卽後世所謂勞瘵也。據程注。五勞虛極一句。是一章題目。羸瘦腹滿。不能飲食。是其證候。食傷。憂傷。飲傷。房室傷。飢傷。勞傷。是其所因。蓋有一于此諸因。皆足以致經絡營衛氣傷。而血脈凝積。以致內有乾血。遂爲五勞虛。



按本草薯蕷味甘溫主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益

氣力長肌肉白豆黃卷別不著其功然大豆則味甘平逐

水脹除胃中熱瘕傷中淋露黑麴味甘大暖療藏腑中風

氣調中下氣新白斂味苦平散結氣

幼幼新書養生必用治風勞氣冷百疾薯蕷丸并治風眩

背拘倦胃滿短氣羸瘦飲食少小兒泄利多汗發熱方

即本方內不濃煎棗湯空心嚼一九日午再服有熱人

即九如桐子大空心日午米飲下二十九止於三十九

酸棗湯方

按此方釋意醫通為優輯義所引肝本草黑字酸棗下云

虛者三字刺

藥料力一闢一闔。此乃玄妙。後世不知此理。專一于補。所以久服必至偏勝之害也。

按此說本于王氏滯  
洄集王說文錄不錄

按先兄紹翁曰。牡丹皮之性較諸桃人。蝨蛭則不唯其力之緩。若單與之。難以潰堅破瘀。蓋其爲功。唯是行血通經。仍以配于桃人大黃。可增除滌之力。合于當歸地黃阿膠等。能引滋液和血之品。而榮養陰分。故參之補瀉之藥。未有所礙。復足以贊其不逮矣。此說能闡前古之祕。

### 薯蕷圓方

尤其用薯蕷最多者。以其不寒不熱。不燥不滑。兼擅補虛去風之長。故以爲君。謂必得正氣理。而後風氣可去耳。



之矣。五苓散之桂。或以發表。或以散寒。藥與病對。其方則一。而其用有異者。是仲景方法之妙致也。

寇氏本草衍義曰。澤瀉其功尤長於行水。張仲景八味丸用之者。亦不過引接桂附等。歸就腎經。別無他意。

朱氏本草衍義補遺曰。仲景八味丸。附子爲少陰之向导。其補自是地黃。後世因以附子爲補。誤矣。附子走而不守。取健悍走下之性。以行地黃之滯。可致遠。亦若烏頭天雄。皆氣壯形博。可爲下部藥之佐。

李氏本草綱目曰。仲景地黃丸。用茯苓澤瀉者。乃取其瀉膀胱之邪氣。非引接也。古人用補藥。必兼瀉邪。邪去則補。

中虛悸。咽乾脣燥。面體少色。或飲食無味。陰陽廢弱。悲憂  
慘戚。多卧少起。久者積年。輕者纔百日。漸至瘦削。五藏氣  
竭。則難可復振。治之湯方。即本方

虛勞腰痛。少腹拘急。

按此證陰虛頗重。而無上炎之勢。故純補下元。而無取于  
建中和諧之法矣。

又按寇宗奭朱震亨王履李時珍竝論此方之理。王李俱  
駁寇氏。然寇說似長。今具列于左。以備參攷。蓋茯苓澤瀉  
或引接桂附。以達下焦。如消渴所用。是也。或藉力桂附。以  
通水淤。如轉胞所用。是也。今如此條。則引接通利。俱兼取



故衄。寒盛于下。故腹中痛。下元不固。而心神不寧。故失精。

血道澀滯。故四肢痠疼。

猶桂枝加芍藥生薑人參新加湯證身疼痛之理。

虛陽外

泛。故手足煩熱。上焦液枯。故咽乾口燥。皆是莫不自陰虛

所致。陰虛故不與陽相諧。是以用小建中湯。和調陰陽。蓋

桂枝湯。營衛均和。而此方則倍芍藥。專滋其陰。以配于陽。

為虛勞正對之治矣。又徐氏。沈氏。及汪繼功所論。頗為精

鑿。文錄不錄。宜閱。

汪說出吳醫彙講。

### 小建中湯方

肘後。凡男女因積勞虛損。或大病後不復常。若四體沈滯。

骨肉疼酸。吸吸少氣。行動喘掣。或小腹拘急。腰背強痛。心

芻也。

結纓必於頤下。段氏可攷。

脈弦而大。弦則為減。大則為芤。

按此條亦見于吐衄中。

按玉篇。芤。苦候切。

集韻。此有病脈二字。

徐氏脈訣云。按之即無。舉之

來至。傷實中央空者。名曰芤。

徐氏不知何人。隋志有徐氏脈經。崇文書目有徐商指訣。

此本于脈經。未為當。空參先君子撰脈學輯要。

戴起宗脈訣刊誤曰。

芤。草名。其葉類葱。中空。又本草綱目。以為葱一名。俱未審何據。

成氏曰。革者。言其既寒且

虛。則氣血改革。不循常度。又方氏。尤氏。並有說。俱未安。

虛勞裏急。悸。衄。

按此條。即虛勞之正證。實屬劉喪太過。虛火上亢者。筋失

所養。故裏急。血脈衰乏。故悸。

悸。即動。築。驗之。病者。知其非心動。

血隨火上。



爲藏府病矣。經絡病可以引年。藏府病難于延歲也。此仲景引虛勞之類以明虛勞也。

按沈氏曰。虛陽上浮則脈大。營衛不充於軀殼相循背之經隧。曰痺俠背行。朱氏曰。大爲虛陽外鼓之大。而非真氣內實之大也。三陽皆虛。痺而不用。竝與尤魏異義。

又按馬刀陶隱居曰。李云。生江漢中。長六七寸。禹錫等謹按蜀本圖經云。生江湖中。細長小蚌也。長三四寸。闊五六分。俠纓。太素作俠嬰。楊上善注曰。頸前曰嬰也。外臺引嬰作纓。攷段氏注說文。纓冠系也。頤頸飾也。嬰繞也。益知作纓者爲是。而俠纓者。俠冠系之謂。卽頤骨下際至人迎兩

晰已。又朱氏曰。然使真陰虧損。亡血失精。二方皆非其任矣。須用八味腎氣丸法。斯言殆然。

男子平人。脈虛弱細微者。

周至盜汗。則陽衰因衛虛。而所虛之衛行於陰。當目瞑之時。無氣以庇之。故腠開而汗。若一覺。則行陽之氣復散於表。而汗止矣。故曰盜汗也。夫至盜汗。而其虛可勝道哉。

人年五六十。其病脈大者。

魏男子平人失精亡血之虛勞。年少而體方柔脆。故易至夭折。年五六十感邪成痺之虛勞。年老而體已堅硬。故可以終其天年。是虛勞而成痺。終是經絡病。虛勞而成失精亡血。則



夫失精家。少腹弦急。

按據巢源。脈極虛。訖遲以下。當為一截看。

脈得諸訖動微緊。

先兄曰。訖與微反。動與緊反。蓋訖動與微緊。自是二脈。則上文脈大為勞。極虛亦為勞之意。故下一諸字也。

按魏氏以為此上有假熱。而下有真寒者。其說頗辨。然熟繹經文。似不必上熱者。

天雄散方

按此方白朮殊多。故徐氏以為中焦陽虛之治。

沈氏同

然天

雄實為補下之品。則其說恐未覈。要之配合之理。殆為難

鑑恐鑿。瞑。眩。通用。後條云。目眩。然則目瞑。卽目眩也。男子字。又出消渴。及黃疸中。宜參。

醫學綱目曰。胗脈虛微細弦。爲虛勞者。蓋陰陽俱虛之症也。晨多見之。

勞之爲病。其脈浮大。

鑑手足煩。卽今之虛勞五心煩熱。陰虛不能藏陽也。陰寒精自出。卽今之虛勞遺精。陰虛不能固守也。酸削不能行。卽今之虛勞膝酸削瘦。骨痿不能起于床也。

按蘭室祕藏。舉此條曰。以黃耆建中湯治之。此亦溫之之意也。



醫學綱目曰。胗脈浮而大。或大而弦。皆為虛勞者。蓋陽盛

陰虛之症也。暮多見之。

男子面色薄者。

重趙作裏。諸本同。玄從鑑曰。脈浮者裏虛也。當是衍文誤矣。

按沈曰。色乃神之旗。營衛之標。若面色薄者。是白而嬌嫩

無神。乃氣虛不統營血於面也。此說與魏氏異趣。

男子脈虛沈弦。

周此為勞傷元氣。所以至此。然則仲景即不言治法。自當調

以甘藥培中土。以益元陽。不待言矣。若舍黃耆建中。又何以

為法耶。

按無寒熱。又見短氣吐血。瘀血。及妊娠中。俱言無外邪。金

通。故輯義併二說而存之。徐曰。陰陽寸口人迎也。尤曰。陰陽俱微。該人迎趺陽太谿爲言。竝誤。又聖濟尺中上補或字。三因方曰。脈當陰陽俱微。尺中少緊。身體如風痺狀。

黃耆桂枝五物湯方

朱如桂枝湯。本爲太陽中風和營衛之要藥。茲特去甘草之和緩。而君以黃耆之峻補者。統率桂芍薑棗。由中達外。俾無形之衛氣。迅疾來復。有形之營血。漸次鼓盪。則痺可開。而風亦無容畱之處矣。

按此說稍是。然黃耆取之托陽逐邪。不取峻補矣。

夫男子平人。脈大爲勞。



掣文則可知亦傷及血。血痺有鍼引陽氣文則可知陽氣亦閉矣。又徐沈程周竝肌膚盛為句。重字接下讀。魏鑑重字連上句。當攷。稻葉元熙曰。重因。趙本作重困。似是。賈誼新書。民臨事而重困。則難為工矣。倉公傳。為重困於俞。忿發為疽。此皆言累困也。

血痺陰陽俱微。

按傷寒論所謂脈之陰陽。皆以部位而言。然此條則自有寸口關上尺中文。故金鑑以浮沈解之。亦猶六難陰盛陽虛陽盛陰虛之意。傷寒論多稱脈陰陽。桂枝湯條不揭脈字而此無脈字。故沈氏以陰陽營衛俱微釋之。蓋此條陰陽義可兩

按此亦以治腳弱而附之也。

○血痺虛勞病脈證并治第六

論一首

脈證九條

當作十條

方九首

當作十首

按醫門法律曰。虛勞之證。金匱敘於血痺之下。可見勞則必勞其精血也。魏氏以爲血痺當編次于中風之後。後人悞敘。與虛勞同篇。喻氏強牽入虛勞中。可謂刻舟求劍。二說未知何是。程氏稍與喻同意。

問曰。血痺病從何得之。

聖惠方盛重作充盛。千金瀉作澀。在上。要有澀字。徐曰小字上。該有微尺中三

字。此說難從。

按歷節血痺。金鑑所辨不允。歷節有風血相搏。卽疼痛如



其方頗夥。茲不錄載。

千金三黃湯

千金此方中分字皆作銖兩。蓋是古式。且六升作五升。三服作二服。腹作脹。枳實一枚作六銖。

悸上有心字。附子上有八角字。

近效方求附湯

類聚作求附子湯

按前有頭風摩散。後人仍附此方。本不干中風也。

崔氏八味丸

按前有礬石湯等。故後人附以此方。蓋此方證。卽病邪淹

畱。痺著少腹者。故從緩治。更有少腹不仁。屬衝心之漸者。

實非此方所對也。

千金方越婢加朮湯

生薑二兩。當從諸本作三兩。

其所宜。活人書稱脚氣用湯淋洗者。醫之大禁。而景岳全書詳論禁不禁之別。當參。

附方

古今錄驗續命湯

輯義外臺風痺門載西州續命湯云云。今要攷外臺此西州二字空刪去。不識人當

作不知人。

按此方。卽大青龍湯變方。而尤氏所謂攻補兼施者已。中風邪氣本輕。但以血氣衰弱殊甚。故招其侮。大抵表候爲內證所掩。往往使人難于辨認。蓋續命湯發表補虛對待爲方。實爲中風正治之劑。而推其立方之旨。則亦足以明中風所因之理。學者豈可不深味乎。如晉唐諸家所增損。



桂枝芍藥知母湯方

按趙氏曰。分兩多而水少。恐分其服。而非一劑也。三因方云。每服四錢。此說有理。蓋此方九味。都三十一兩。當今秤十二錢五分八釐八毫。水七升。當今量七合七勺。則當從防風湯改正為順。

烏頭湯方

原本屈節作屈伸當改

按此方。比之桂枝知母湯。其力更烈。治歷節初起急劇證。功效不可言。黃耆亦以驅溼。說見于前。

礬石湯

按此方。用之腳氣。如痿軟引日者。或見奏功。衝心之證。豈

然前人未言及。  
附記俟識者。

又玉篇臙脰腫兒。是魁瘰之从肉者。益足  
以徵前說。蓋次條亦有身體羸瘦而魁瘰字。所不習見。故  
後人改作疔羸。而其本義晦矣。

又按肢節疼痛。身體魁瘰。腳腫如脫。三證疊言者。亦猶麻  
黃湯。身疼腰痛。骨節疼痛之例。且此云腳腫如脫。次條云  
獨足腫大者。言寒溼下注。下部特浮。其久不愈者。往往變  
為鶴膝風。亦溼滯所致耳。又短氣與甘草附子湯證短氣  
同機。

本草玉石部。陳藏器餘云。白師子。主白虎病。向東人呼為  
歷骨風。  
政和本作江東人呼為歷節風。



下部。曰脚腫如脫。曰獨足腫大是。

黃汗之腫及于徧體。曰四肢頭面腫。曰身腫是。

節之痛轉歷諸節。

其名可徵。黃汗之痛必不轉歷。曰骨節疼痛。曰腰體弛痛。

曰身疼重是。

且其胸中窒如痛。久不愈必致癰腫等證。實黃汗

之所獨。而歷節則無此瘀鬱之態也。但近時未見黃汗病

亦未見歷節有黃汗出者。姑就文義而論之已。

諸肢節疼痛。身體魁癰。

脈經作魁癰。類聚同。輯義。魁。譌。癰。趙原刻作魁。

按魁癰恐以魁癰為是。爾雅。杓適。木魁癰。注。謂樹木叢生。

根枝節目盤結。硯。釋文。瘰。郭。盧。罪。反。邢。曷。曰。魁。瘰。讀若

硯。據此。魁癰。蓋爾雅之魁瘰。謂疼痛之處盤結。硯也。

正與病證相協。硯亦作硯。見玉篇。其義可見耳。竊疑爾雅魁瘰。或魁癰譌。

按據千金風眩門此係徐嗣伯方

寸口脈沈而弱沈即主骨弱即主筋

按此條不言痛者蓋省文也如水傷心注家就心主汗為解然汗出入水中恐不遽傷及心且歷節是筋骨間病固不干心藏仍疑心字有譌或曰心主血脈傷心猶言傷血脈亦屬臆說

又按歷節黃汗之辨尤氏為確徐氏曰黃汗重在腫歷節重在痛亦是

徐要有詳說欠覈

今更審之曰黃汗出曰肢節疼痛

曰發熱皆是二病所俱有然歷節之黃汗特在痛處

曰歷節黃

汗出黃汗之汗洽于周身

曰汗沾衣色正黃如藥汁是

歷節之腫多止



按本草衍義作治風熱瘕瘕及驚癇瘕瘕幼幼新書作除

熱去癲癇輯義癲字偶譌作癲醫壘元戎作除熱癲癇

又按尤氏以此方為猛劑然其藥不過大黃石膏等而僅

用三指撮則固無須顧慮矣三指撮即方寸匕餘素問識

病能論下引陶氏序例以證之

千金治少小壯熱渴引飲下痢龍骨湯方

於本方去乾薑牡蠣滑石白石脂紫石英加栝樓根各二

兩治下篩以酒水各五合煮散二合二沸去滓量兒大

小服之按二合疑宜覆審

防已地黃湯

甘草一分趙本作二錢類聚作二分

難言口吐涎者其病深固必心神不收百治難效者也

侯氏黑散

俞本類聚曰能作自能

寸口脈遲而緩

按營緩衛緩二句是雙關文法上句是客詞下句是主詞

對舉以為榮虛衛虛之辨緩字承上文猶言虛

太陽下篇緊反入裏

緊字指邪而言是同語例

榮緩言尺中緩者榮必虛衛緩言寸口緩者

衛必虛衛虛故中風也榮緩一句本不干中風而注家牽

合為說未免踏錯

風引湯除熱癰瘰

牡蠣各三兩原本諸本作二兩當改

張氏千金方衍義曰風引者風淫末疾而四肢引動也



平脈法曰。仁者柔也。不仁者言不柔和也。為寒熱痛痺俱不覺知者也。又曰。不仁者強直而無覺也。成說不確。當與血痺

篇及素問識診要經終論血氣形志篇互參

又按徐氏曰。至入府。府邪必歸于胃。胃為六府之總司也。

于是風入胃中。胃熱必盛。蒸其津液。結為痰涎。氣壅隧道。

胃之支脈絡心者。纔有壅塞。即堵其神氣出入之竅。故不

識人。以上醫門法律文試觀俗做陳搏。按住頸間。兩人迎脈氣。即

壅逆。不識人。人迎者。胃脈也。則不識人之由。胃氣壅。不信

然哉。此說或有理。蓋入府入藏。其證似輕重相錯。然細繹

其理。不識人者。一時昏塞。暫時醒省。即卒中閉證之謂。舌

此條徐注為覈

本于趙氏

然瘧有痰癖積聚許仁則既有其說

則此所用亦為兼治飲結者蓋其趣似異而實同者也

○中風歷節病脈證并治第五

論一首

脈證三條

三疑七論

方十二首

夫風之為病當半身不遂

按凡形骸一節之氣閉而不仁者皆謂之痺今止云臂者

蓋舉一隅爾

寸口脈浮而緊

按痺論曰皮膚不營故為不仁次注曰不仁者皮頑不知

有無也診要經終論次注曰不仁謂不知善惡又成氏注

金匱述義卷上

金匱述義卷上

卷上

孫越人校

子成



牡蠣湯

外臺甘草炙。右四味切。以水先洗蜀漆三遍。去腥。以水八升。煮蜀漆及麻黃。去沫。取六升。內二物。更煎取

二升。去滓。溫服一升。即吐。勿更服。則愈。

按此方。吐而兼汗者。張戴人法。間有此類。然愚嘗用治瘧

夜間發。及熱甚無汗者。服後不吐而汗。稍稍邪解就愈。尤

氏以謂外攻之力較猛者。信矣。

柴胡去半夏加栝蒌湯

外臺甘草下。有炙字。生薑三兩。大棗下。有擘字。七味下。有切字。再作更。日

二服。作日三。千金名柴胡栝蒌湯。用柴胡三兩。大棗二十枚。論

柴胡桂枝乾薑湯

原注如熱。是如神論。

按此方。宋人取而附此。蓋有所據也。今依治瘧如神之言。

殆不虛誣。太陽下篇所用。係于太少併病。而兼飲結者。如

有治瘡之能。竊以爲此二味及牡蠣俱有解水結之功。故與蜀漆相配。能豁瘡痰也。肘後方曰。老瘡久不斷者。末龍骨方寸匕。先發一時。以酒一升半煮三沸。及熱盡服。溫覆取汗。便卽效。千金翼曰。療痰飲頭痛。往來寒熱方。常山一兩。雲母粉二兩。右二味爲散。熟湯服方寸匕。吐之止。若吐不盡。更服。竝與此方。其意相似。又刺瘡篇次注曰。先其發時。真邪異居。波隴不起。故可治。過時則真邪相合。攻之則反傷真氣。故曰失時。蓋得此說。而此方服法。義益明矣。輯義

所引得効方文。本出三因方。丹溪纂要文。本出保命集。

附外臺祕要方

金匱述義卷止

金匱述義卷止

卷止

子成藥



發熱而渴。不惡寒者。為溫病。知是溫瘧之溫。與溫病之溫。

實同其義。詳論于傷寒論述義中。瘧邪本在少陽。故時嘔。此證則熱。

邪熏胃者為甚。故身無寒但熱。更就骨節疼煩視之。則猶

有表邪在。故加桂枝于白虎湯中。以兼治表裏。此證白虎清涼而少

陽之邪亦解。猶三陽合病用白虎之例。但其脈如平。諸注未瑩。愚亦未曾遇

此病。末由知其理。存而闕疑已。

瘧多寒者。名曰牡瘧。宋本外臺作牡瘧。下蜀漆散同。蓋其作牡者。程衍道所意改。存攷。

蜀漆散方。外臺引作蜀漆洗去腥。雲母龍骨右三味等分。搗篩為散。先未發前一炊。以清酢漿水和半錢服。臨發時。

一更服一錢。溫瘧者加蜀漆半分。雲母炭火燒之。三日三夜用。按外臺似是千金一炊下有頃字。

按雲母龍骨性用。注家所說似未明晰。攷之本草亦未見

皇甫士安解散消石大凡說云。消石。三月採於赤山。

聖濟。鰲肉煎丸。

主證同

不用鰲甲。以生鰲肉半斤。治如食法。

去紫威。蜂窠。赤消。加海藻。紫苑。大戟。各一分。餘藥亦皆一分。桑螵

蛸一兩。修製與本方同。

師曰。陰氣孤絕。

外臺引。師曰。上有辨瘡病三字。則熱而作而脈微者。其候必七字。肌作脫。類聚亦作脫。

溫瘡者。其脈如平。

脈經作瘡。但見熱者。溫瘡也。其脈平。身無寒。但熱。骨節疼煩。時嘔。朝發暮解。暮發朝解。名

曰溫瘡。白虎加桂枝湯主之。巢源曰。夫病瘡六七日。但見熱者。溫瘡矣。又千金外臺文互有異。今不繇載。

按內經以先熱後寒為溫瘡。仲景則以無寒但熱為溫瘡。

稍與上條瘰癧相近。蓋是別發一義者。不宜援內經溫瘡

為說矣。內經稱冬傷於寒。春必溫病。而仲景則曰。太陽病。

金匱要略卷之六

五

子我藥性論



分下有洗字。蜣螂熬作炙。桃仁作三分去皮尖熬。灰字並作土字。一斛五斗作一斛五升。按古方所言分者。係裁分之分。非六銖為分之分。此方驚甲千金注作三兩而鍛竈下亦與清酒俱有定量。則他藥以分稱者。蓋後人所妄改。其三分者。字作十八銖。六分字作一兩十二銖。五分字作一兩六銖。二分字作六銖。二分字作十二銖。四分字作一兩。始合古義。又輯義石韋紫威从舛。是書手誤筆。

按弟子山內慮曰。此方逐血之品特多者。以瘡至久則血道澀滯。與邪搏結。楊仁齋有瘡有水有血。當以常山草菓。檳榔青皮烏梅甘草作劑。加五靈脂桃仁為佐之說。其意可見矣。此說為是。此方蓋崔氏所謂羈縻攻之者。見外臺癰瘕中注家以為急治。恐誤。又本草鼠婦條。圖經云。張仲景主久瘡大鼈甲丸中使之。以其主寒熱也。又芒消條。陶隱居引。

又按弦數者風發也。以飲食消息止之。外臺無止字。似義稍長。巢源載本條。無此二句。有凡瘡先發如食頃。乃可以治之。過之則失時十七字。本是刺瘡篇文。

又按外臺引此條後有一條。云。又辨瘡歲歲發至三歲發。

連日發不解者。以脅下有痞也。療之不得攻其痞。但虛其

津液。先其時發汗。其服湯已。先小寒者。漸引衣自覆汗出。

小便利則愈。瘡者。病人形瘦。皮上必粟起。巢源千金亦有此條。千金連日

上有或字。巢源文少異。未截。作夫瘡其人形瘦皮必慄。

病瘡以月一日發。外臺病上有問字。其作期。類聚圓作丸。下竝同。

鼈甲煎圓方。外臺烏扇下。無燒字。葶藶二分。石韋二分。無去毛字。厚朴三分下。有炙字。牡丹下。無去心字。半夏一



師曰瘧脈自弦。

外臺師曰上有辨瘧脈三字可溫之作溫藥已。

緊巢源作脈數而緊者外臺可吐之作吐之弦數上有脈字消息止之作消息之。

按此條就脈候以示瘧病證治之綱領蓋瘧是半表半裏

之病其有表裏證亦少陽病邪之所派及不比傷寒太陽

陽明之情機故其汗吐下亦與傷寒之治例不同所言弦

數者多熱卽白虎加桂枝湯柴胡去半夏加枳椇湯證也

弦小緊者下之差鼈甲煎丸是也弦遲者可溫之柴胡桂

枝乾薑湯是也弦緊者可發汗牡蠣湯是也浮大者可吐

之蜀漆散是也療瘧之法實不能出于此數件矣程氏謂

不可考者恐不然也又刺瘧篇曰瘧脈小實急灸脛少陰

餘述百合狐惑陰陽毒三病。攷之巢源千金。多係傷寒後  
所變。此其所以合爲一篇歟。但百合狐惑。注家或謂在後  
世爲某病。然其說竟屬牽湊。實不能知其爲何證。如陽毒  
陰毒。就唐宋諸書攷之。則殆是三陽合病。與少陰直中之  
類。然仲景不舉之傷寒論中。則知是別一種證。而亦未明  
其爲今之某病也。然則三病也者。古特有而今絕無者耳。  
痘疹創於東漢。腳氣盛於晉唐。風會變遷。理之所然。庸詎  
疑于古今之有異乎。

○瘡病脈證并治第四

證二條

按此上當脫脈字

方六首



按漿水詳開于傷寒論述義差後勞復中茲不復贅

陽毒之為病

脈經作陽毒為病身重腰背痛煩悶不安狂言或走見鬼或吐血下痢其脈浮大數面赤斑斑如錦

文

喉咽痛唾膿血五日可治至七日不可治也

二日便成陽毒

或服藥吐下後變成陽毒升麻湯主之

陰毒之為病

脈經作陰毒為病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑

四肢厥冷

其脈沈細緊數身如被打五六日可治至七日不可治也

治也

或傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日以上至

十日變成陰毒

甘草湯主之

升麻鼈甲湯方

今本肘後千金療陰毒有蜀椒與原注合周本當歸二兩再服取汗取字輯義偶脫宜補

郭氏曰升麻甘草二湯觀其用藥性甚緩然諸家必先用

之者以古人治陰陽二毒者惟此二湯故須用之以去其

毒勢而後輔之以他藥也

蝕於下部則咽乾。脈經作蝕於下部。苦參湯淹洗之。

蝕於肛者。薰諸本作薰。宜從黃下。周有散字。

按猪苓散圖經引張仲景。本草原文茯苓下有求字。水字上有與字。輯義竝係刊脫。宜補。

病者脈數無熱微煩。

先兄曰。總病論以此為狐惑證。弟子稻葉元熙曰。脈經千

金亦編入于狐惑中。

按朱氏曰。按此證若未成膿。必不能食。亦必另用清熱托毒方法。凡治瘡瘍之理皆然。無熱無字疑悞。當是發熱也。此說似是。然據瘡癰篇無字不改而義通。

赤小豆當歸散方

周本當歸十兩。



升。頃友人言。吾蘇陽山澄照寺前。一片地上。天然自產百合。僅如錢大。煮之。清香絕勝。療病極効。可知百合入藥者。以小爲貴耳。

按本草嘉祐新補泉水條云。久服。卻溫調中。下熱氣。利小便。可見其有瀉陽之功矣。

百合病。不經吐下發汗。

先兄曰。如初言患狀遷延。不與初時異也。鑑說恐非。

括樓牡蠣散方

牡蠣熬。周本熬作煨。

狐惑之爲病。狀如傷寒。

輯義。脫其面目之目。宐補脈經狀作其氣爲狐下。有狐惑之病。竝五字。

按下疳多止前陰。牙疳不必及咽喉。金鑑未爲當。

氏直改其語云。治汗後百合病。治下後百合病。治吐後百  
合病。尤使人不疑也。

百合知母湯方

按此方與後三方服法中用煎字蓋係後人所改外臺作者字空從

按先兄曰。宋吳曾能改齋漫錄曰。王原叔內翰云。醫藥治  
病或以意類取。至如百合治病。似取其名。嘔血用胭脂紅  
花。似取其色。淋瀝滯結。則以燈心木通。似取其類。意類相  
假。變化感通。不可不知其旨也。此說與魏意稍近。又朱氏  
格致餘論曰。本草藥之命名。以能而名者。百合當歸升麻  
防風滑石之類。是也。此說慎矣。

吳醫彙講。王繩林曰。古方惟百合湯用百合七隻。配水三



氏傷寒補論曰。此證又與素問所謂解休者相類。王氏醫壘元戎。舉王冰平人氣象論解休注曰。惟百合一證。與此比比相若。竝是趙氏所本。要之趙說太謬。又吳醫彙講有陶宗暄百合病贅言。謂爲心神渙散證。亦非是。百合病發汗後者。

郭氏辨千金有夏發字曰。其意謂百合本病汗下吐之後而夏發。非傷寒汗下吐之後變成百合病也。反似百合病中治勞復之傷。而不見正行汗下吐百合病之藥於義未甚安。恐因數百年間傳錄校正。誤有增加。非孫氏之本文。故活人書只用金匱本文。不用千金增加夏發等字。而龐

論曰百合病者。百脈一宗。悉致其病也。

默然周作  
默然然

趙言其百脈者。舉夫數之衆多也。猶言百骸爾。程經脈十二絡脈三百六十五。此緣大病後。真陽已虛。餘熱未盡。周身百脈俱病。是爲百脈一宗。悉致其病也。

按巢源千金竝曰。百合病者。謂無經絡。句百脈一宗。悉致

病也。蓋無經絡者。謂無經脈絡脈之別。宗猶同姓爲宗之

宗。一宗猶言一齊。注家或以爲朝宗之宗。或以爲宗尊之

宗者。俱失其義。

又按此病。趙氏以爲熱畜不散。積則毒生。而傷其血所致。與內經解休證無少異。又與勞瘵同形狀。其說甚長。攷郭



自表而入者。舉之于雜病論。此篇卽是也。然則宜云燥溼  
喝。而除燥不言者。何也。蓋燥之一氣。爲秋之令。而未見其  
傷人。如風寒暑溼者。是論之所以不及此也。內經言秋傷  
於溼。而不言  
秋傷於燥。又言燥勝則乾者。亦非秋燥之謂。而所謂燥溼  
寒暑者。是地之燥溼。而非天氣之燥溼。後世有燥疫及秋  
燥病等說。要是門  
外揣摩。不足信也。但瘕則以內燥。而招外邪。然其情機。則  
稍異于風寒。故與溼喝爲篇。益足以知秋燥之不爲病矣。  
且夫瘕也。溼也。喝也。其脈因證治。纖悉具備如此。則知殆  
是仲景之舊面。而非後人所節略矣。

○百合狐惑陰陽毒病證治第三

徐鑑作脈證  
并治宜從

論一首

證三條

按當  
二條

方十二首

扇之是也。

太陽中暍。身熱疼重而脈微弱。

按趙氏周氏有中暍統論。欠覈不錄。

雲岐子傷寒保命集曰。太陽中暍者。身熱而煩。汗欲出。反

飲冷水。灌之汗不能出。水行皮中。而脈微弱。表有水也。當

發其汗。宜升麻湯。升麻。葛根。芍藥。甘草。各一兩。右剉細。每服

一兩水三盞煎服。

餘述仲景之以瘧溼暍合為一篇。厥有旨哉。夫天之氣風

寒暑溼燥也。其令之有德。與人之有虛。皆相感為病。而風

寒二氣傷人最夥。故著傷寒論以盡其理。而他氣之傷人。



為佳。

太陽中熱者。喝是也。

按此條與前條。即中喝虛實之別。而喝證之理。無出于此二端。徐氏注上條曰。此即潔古所謂靜而得之。為中暑。為

陰證也。注此條曰。動而得之。為中熱。為陽證也。誤矣。潔古所謂

中暑。即夏月傷涼之病。張介賓名為陰暑。雖俱名曰暑。其實非暑邪也。又熱論所謂病暑者。亦是傷寒。以時而異其名耳。不可援以注本經也。

又按山海經。北囂之山。鳥名鷲鷃。食之已喝。莊子雜篇則陽曰。夫凍者假衣於春。喝者反冬乎冷風。又方氏曰。喝。傷暑也。史記禹扇喝。淮南子。武王蔭喝人于櫟下。左擁而右

風之中人也。因有寒暑。寒則皮膚急。腠理閉。暑則皮膚緩。腠理開。開則洒然寒。閉則熱而悶。近人多不明中暑。或作熱病法治之。復用溫熱藥。必致發黃斑出。更爲畜血。尤宜戒之。

按先兄曰。鄭玄易通卦驗注。太陽脈起足少指端。至前兩

板齒。雲岐子傷寒保命集曰。口開前板齒乾燥者。牙乃骨

之精。今燥者骨熱也。此說近鑿。又沈氏曰。當以辛涼解表。

甘寒清裏。卽後人所用香茹散之類。亦非是。蓋此證清涼

如黃連石滲利如五苓溫中如大順俱非所適。但香薷實

解暑之聖藥。或加一味于潤補方中。如黃芪湯生未必不

三才圖會卷之二十一  
醫部全錄卷之二十一  
雜考

三

子成集卷之三  
雜考



趙註雖已解過治之失。於當救之道則未明。按註言成氏予嘗思

之。此證屬陰陽俱虛。脈弦細者。陽虛也。芤遲者。陰虛也。所以溫鍼復損其陰。汗之復損其陽。此證惟宜甘藥補正。以解其熱爾。卽靈樞所謂陰陽俱不足。補陽則陰竭。補陰則陽脫。可將以甘藥。不可飲以剛劑。

按柯氏曰。弦細芤遲。不得連讀。言中暑夾寒之脈。或微弱。或弦細。或芤遲。皆是虛脈。蓋細與芤不併見。柯說爲是。然此證雖陰陽俱虛。而暑邪纏緣。津液乏燥。且熱證亦見。遲脈則謂之夾寒。恐不爲當。

活人書曰。問中暑何故洒然毛聳惡寒。答曰。經云。四時八

條及此條俱係表虛寒證。雖溼邪持久。猶是少陰直中之類。而桂枝附子湯。求附湯。甘草附子湯。亦猶麻黃附子細辛甘草二湯。及附子湯之例矣。尤氏於治溼諸方有總議。殊欠覈當。仍不錄。

甘草附子湯方

聖濟。附子湯。治中風四肢攣急。身體沈重。骨節煩疼。

卽本方。薑棗同煎。

百一選方。史氏白朮散。治腰痛。

於本方。去甘草。加芍藥。

太陽中暈。發熱惡寒。

按數下之數字。非誤卽衍。



白朮附子湯方

朱如冒狀者。正氣鼓動。水氣亦隨而動。正邪相搏。未得遽勝之象。所謂與朮附竝走也。

按此方亦係于發表。既詳之傷寒論述義中。茲不復贅。風溼相搏。骨節疼痛。

鑑汗出短氣。惡風不欲去衣。皆風邪壅盛也。小便不利。溼內畜也。尤此亦溼勝陽微之證。其治亦不出助陽散溼之法。云得微汗則解者。非正發汗也。陽復而陰自解耳。

按傷寒表證。大端有二。曰太陽病。曰少陰病直中。顧溼家亦不過如此。蓋其太陽證治。麻黃加朮湯等條。是已。如前

耆芍桂酒湯。桂枝加黃耆湯。皆用治溼著。蓋托陽排結於濡滯之邪。適然相對矣。求之驅外溼。既如前述。況方後曰。服後當如蟲行皮中。曰。今微汗差。則知此方為風溼家解肌之治。而非滲利之劑也明矣。

防己黃耆湯方

方後如冰。趙原刻猶作冰。

傷寒八九日。風溼相搏。

周傷寒至八九日。亦云久矣。既不傳經。復不入腑者。因風溼持之也。

按風溼相搏句。當與八九日字易位看。金鑑本于沈氏。以為風溼之病。得之傷寒八九日。非是。



金匱要略卷一  
病者一身盡疼。發熱日晡所劇者。

按發熱日晡所劇者。以溼爲陰邪。故得陰時而加甚也。蓋此證。溼邪滯著稍深。而其表則實。故於麻黃湯中。增損以治之。亦猶傷寒有葛根湯之例。

風溼。脈浮身重。汗出惡風者。

按此風溼之表虛者。亦猶桂枝湯之例。故嫌麻黃之峻。其不用陽旦者。豈以爲藥之濫乎。防己黃耆湯。注家以爲實衛滲溼之劑。此殊不然。防己皮水有防己茯苓湯。而陶隱居曰。是療風水家要藥爾。然則亦是係逐表溼之品。黃耆。但黃耆建中湯治裏虛。其他如黃耆桂枝五物湯。烏頭湯。

以自能飲食。胸腹別無滿痞。爲腹中和無病。知其溼氣微淺。內藥鼻中。以宣泄頭中寒溼。

按本事方載有本證治驗二則。竝用瓜蒂散。宜參。

溼家身煩疼。可與麻黃加朮湯。

按此條乃證以方略者也。今就其方攷之。是風溼之屬表實者。發熱惡寒無汗。其脈浮緊。可推而知矣。故以麻黃湯發散鬱邪。加朮以驅表溼。此方之朮。宜用蒼朮。非逐裏溼也。蓋仲景分風溼太陽病。以爲三等。亦猶風寒之例。又黎居士簡易方。以此證爲寒溼。恐不然。

麻黃加朮湯方

類聚甘  
草一兩

金匱要略卷之七

七

孫越藥經卷之七



此事難知。曰。服解藥而去。沈困。只頭痛目悶。是知溼去而風不去。則欲解也。若風去而溼不去。則不解。何以然。風則高。溼則下而入裏也。○按此說不了。

溼家病。身疼發熱。面黃而喘。

成氏曰。病有淺深。證有中外。此則溼邪淺者也。何以言之。溼家不云關節煩疼。而云身上疼痛。是溼氣不流關節。而外客肌表也。不云發熱。身似熏黃。復云發熱面黃而喘。是溼不干於脾。而薄於上焦也。陰受溼氣。則溼邪爲深。今頭痛鼻塞而煩。是溼客於陽。而不客於陰也。溼家之脈當沈細。爲溼氣內流。脈大者陽也。則溼不內流。而外在表也。又

篇婦人  
雜病篇

太陽下篇五苓散條曰。其人渴而口燥煩。亦同語

例。

溼家下之。額上汗出。

徐雖仲景有下之早則噦句。似乎太早不可。而後則可下也。

不知此為頭汗而表未解者。慮其有內入之事。表邪內入。則

可下矣。非言治溼可下也。

風溼相搏。一身盡疼痛。

按朱氏曰。以見此證宜桂枝加朮湯。而非麻黃湯之任。值

天陰雨句。更示人因時變通意。此說不必。蓋此條示風溼

取汗之例。不宜擬定一方。





尤溼外盛者。其陽必內鬱。溼外盛為身疼。陽內鬱則發熱。熱與溼合。交蒸互鬱。則身色如熏黃。熏者如煙之熏。色黃而晦。溼氣沈滯故也。若熱黃則黃而明。所謂身黃如橘子色也。

按此證亦純于溼者。郭氏補亡論曰。宜五苓散。然其病屬

外。殆是麻黃連軹赤小豆湯所宜也。

宜下以傷寒論述義溼熱條相參巢源

風黃候曰。凡人先患風溼。復遇冷氣相搏。則舉身疼痛。發熱而體黃也。又有風黃疸候。竝是別證。

溼家。其人但頭汗出。

胸上趙作胸中

尤寒溼居表。陽氣不得外通。而但上越。為頭汗出。朱背強惡寒者。以背皆陽經所主。為溼所痹也。魏欲得被覆向火。惡寒。



快調和平之謂。言小便不利者。津液偏滲大腸。法當濡瀉。而今溼邪壅閉。水氣內鬱。不敢漏泄。故使大便反如平也。  
注家多以濡瀉解快字。然瀉利數行。豈得云之快。且小便不利者。勢必瀉利。則不宜下反字。故知前注之非。顧如此證。綢繆失治。必變遍身浮腫。

又按成氏曰。痺。痛也。因其關節煩疼。而名曰溼痺。非腳氣之痺也。此說本于許氏說文。又魏氏曰。溼氣不孤行。必附於別氣。非風則寒。今感入而關節疼痛。知附于寒者多。而為病于太陽者同也。非是。又黃仲理於此證擬方曰。甘草附子湯。麻黃連翹赤小豆湯。竝不確。

溼家之為病。一身盡疼。

發汗太多。風病誤汗下。瘡家過汗。皆是瘵之所因。而併產後發瘵觀之。則其非徑得之者。可以見矣。其證必備表候。而冠以太陽病。則外邪所觸而致者。亦可以知矣。

太陽病。關節疼痛而煩。

玉函脈經細作緩。活人書注曰。脈細者。非也。此名以下。徐沈朱作此名中。溼亦

曰溼痺。其候云云。非是。

按溼病有挾風寒者。今此證則純于溼者。故舉為溼病之首。先後篇所謂溼流關節是也。成氏既引此句以為解。此條尤氏注

甚覈。蓋溼邪不藉風寒。則更易濡滯。勢必趣裏。是以治法不事驅表。但利其小便。則外溼亦隨消除也。煩字。錢注為當。或以為心煩者誤矣。大便反快句。諸注未安。愚意快者。



以致津血不榮者。有因真元本虛。六淫之邪乘襲。致血不榮養者。雖有數因不同。其於津血有虧。無以滋榮經脈。則一詳先哲謂汗下過多。及病後產後。與大耗精耗血之病。皆能作瘰。其意可見。學者不可力執局方。專用風藥而療。在乎分因用藥可也。以上汪說。蓋辨瘰之非溼。此爲藍本。其見甚卓。惜強分頭緒。稍屬多事。如張介賓專以內因論。似不熟繹經文者。則又遜于汪氏一等矣。

又按柯氏曰。夫瘰之始也。本非正病。必夾雜于他病之中。此說殆佳。蓋其人本有某故。而營血內乏。或外感誤治。而亾其津液。俱使邪火就燥。以著筋脈。遂爲勁急也。太陽病

氣者。豈病深熱極。非此不能治歟。然曰可與。則猶有斟酌之意。用者慎之。朱氏曰。急與大承氣。以下其熱實。則枳朴消黃。未始非滌熱生津除熱之神品也。竝與金鑑相發。又按汪機醫學原理曰。瘧病。方書皆謂感受風溼而致。多用風藥。予細詳之。恐仍未備。當作氣血內虛。外邪干之所致。蓋人百骸九竅。必本氣血榮養。始能運動。觀內經云。足得血而能步。掌得血而能握。目得血而能視等文。可見。蓋筋脈無血榮養。則強直不能運動。瘧病之證是也。但因有數者不同。是以有氣虛不能引導津血。以養筋脈而致者。有津血不足。無以榮養筋脈而致者。有因痰火塞窒經隧。



方可借爲柔瘕裏虛之治。

栝樓桂枝湯方

按三升下似脫去滓二字

太陽病無汗而小便反少。

按無汗則津液內多。小便當利。而反少者。以其人津燥之故。尤注謬矣。

瘕爲病。胸滿口噤。卧不著席。

按千金方曰。諸反張。大人脊下容側手。小兒容三指者。不可復治也。此龐氏所據。沈氏曰。大承氣湯。或見內實。原有疏解。非爲攻下而設。尤氏曰。此瘕病之屬陽明瘕熱者。然無燥實見證。自宜滌熱。而勿蕩實。乃不用調胃。而用大承。

頭痛項強。發熱惡風寒具見也。

按太陽證備。尤引趙氏。其說迂。徐程爲穩。脈反沈遲者。與桂枝加芍藥生薑人參新加湯證。殆同其轍。

又按括樓桂枝湯。爲柔瘕初治之方。先教諭別有瘕病論。曰。剛瘕表證。與葛根湯。入胃者。承氣湯。柔瘕表證。與括樓桂枝湯。倘裏氣亦虛者。桂枝加附子湯。芍藥甘草附子湯。真武湯。活人附朮散。聖濟附子散之屬。理所宜然。亡血產後。陽盛陰虛。或有<sub>下</sub>不中與附子者。乃參歸湯。人參建中湯。及景岳滋補數方。當採擇而用焉。又沈氏曰。有<sub>下</sub>竹葉湯加附子。以治產後頸項強。乃陽虛溼盛之瘕。此言不覈。然其



金匱要略卷一  
按此條諸證。皆是係于邪著筋脈。風熱上扇之所致。諸注  
強爲解事。不必然。又軒邨寧熙曰。若發其汗以下十七字。  
蓋溼病中之文。今錯在此也。此說似是。

暴腹脹大者。爲欲解。

徐瘕家之脈。總不離于沈緊。今之伏弦。亦沈緊類耳。

按如故二字難解。王肯堂曰。此瘕字。恐當作死字。非是。  
夫瘕脈。按之緊如弦。

按轉筋篇。轉筋之爲病。其人臂腳直。脈上下行微弦。

太陽病其證備。身體強几几然。

徐太陽病其證備者。身熱頭痛汗出也。程太陽病其證備。言

夫風病下之則痊。

按風病猶言風家。不過與前條均言太陽病。

瘡家雖身疼痛不可發汗。

按瘡家謂金瘡家。

瘡古作創說詳于傷寒論述義中。

蓋身疼痛本麻黃湯

所主。如金瘡家軀殼血乏縱得傷寒倘發其汗則筋脈益燥遂為瘕病也。此與破傷風之邪入自瘡口者其機稍異。

又按以上三條言瘕病所由醫通每處一方非是。

病者身熱足寒頸項強急。

原注洽洽字趙本不複。

張錫駒曰頸項強急則不能轉舒而動搖故獨頭面搖也。

成氏曰卒口噤皆不常噤也有時而緩。



不係惡寒不惡寒也。括樓桂枝湯條曰。太陽病其證備。亦可以徵。

又按趙氏曰。所謂柔瘕者。非不强也。但剛瘕强而有力。柔瘕强而無力爲異爾。此金鑑所本。又聖惠方曰。陽瘕卽易差。陰瘕卽難差。又曰。柴胡散。治傷寒陰瘕。閉目仰面。石膏散。治傷寒陽瘕。通身熱仰目。此解惑論所本。先兄曰。曲禮剛日柔日。卽陰陽之義。

太陽病發熱脈沈而細者。

按脈沈而細。徐錢以爲瘕病正脈。

然則細是緊細之細。非微細之細。而瘕

之必難治。程鑑等以爲瘕見此脈者。氣少之候。故難治。

章發攻導諸劑之祕焉。夫然後辨證處治之例。無出於此篇範圍之外。則此篇者。真醫家之大經大法也。

○瘕溼喝病脈證第二

俞本證下有治字是

論一首

脈證十二條

當作十六條

方十一首

太陽病發熱無汗。

太陽病發熱汗出。

按反惡寒。錢注竟屬牽強。蓋反是而字譌。千金翼可以徵

焉。

千金翼作而反惡寒。竊想反字後人從本經所補入。

不惡寒。諸注亦不確。巢源無

不字。林億等校傷寒論。及總病論。並既引證之。為是要之

此二證俱有惡寒。惟須以無汗與汗出。為表實表虛之分。



主在外感。兩相對列。使人知病之不出二端。其義二也。治病之要。不過防微。渴穿鬪鑄。先聖所戒。是以首章舉治未病。而次條亦曰。未流傳府藏。卽醫治之。曰。勿令九竅閉塞。皆示見微得過之意。其義三也。此三義者。豈可不謂非醫家入學之門徑乎。其他諸條。辨色。辨聲。辨氣。息。辨色。脈。應否。辨脈之先後。診察之法盡矣。病有起于急遽者。吉凶不可不察。內因之病。皆有數目。外感之疾。各有法度。五藏之病。有所得。有所惡。亦辨證之綱領也。如夫天氣消長。人身亦應之。則其理不得不講也。施治之法。先示防微。又示淺深之有別。又論病之表裏新久。必有先後之序。而篇末一

之能食。非除中也。金匱要略云。病人素不能食。而反暴思之。必發熱。是成氏既以思字作食義看。

夫諸病在藏。

按此條猪苓湯。不過姑假之以備隅反。徐沈朱附出其方。深誤。

餘述此篇。仲景揭示辨證處治之總例。而其最緊要在首章與第二章。今深繹其意。則寓有三義。蓋人之有身。以藏府爲之主宰。故論理疾病。必始自藏府。實爲軒岐相傳之學。故仲景舉之于首。以爲後人模範。其義一也。病之大體。不過二端。曰內傷。曰外感。是已。首章所主在內傷。次章所



寒暑溼。饑飽勞逸。皆各是邪。非獨鬼氣疫癘者矣。本條邪字。得此言而始明矣。

先兄曰。盧文弨鍾山札記。詳辨磬字。宜參。

夫病痼疾。加以卒病。

按說文。痼。久病也。

汲古閣刊宋本作痼。譌。

又金鑑所引趙注。二注本

以爲周氏。

師曰。五藏病各有得者愈。

按尤氏引藏氣法時論。宣明五氣篇。五味篇爲徵。宜參。又成氏注厥陰篇除中條曰。若胃氣絕。得麪則必發熱。若不發熱者。胃氣尚在也。恐是寒極變熱。因暴熱來而復去。使

極寒極熱可謂盡矣。但注家於大邪小邪迂曲費說甚失經旨。不知三節互相照應。大邪言風。小邪言寒。其義瞭然。周氏所解殊卓。蓋風則泛散。故稱之大。寒則緊迫。故稱之小。且風之傷人爲最多。寒則稍遜。亦其所以得名歟。風性輕揚。故先中表。而令脈浮。寒性慄悍。故直中裏。而令脈急。又按素太陰陽明論曰。故傷於風者。上先受之。傷於溼者。下先受之。靈百病始生篇曰。風雨則傷上。清溼則傷下。辨脈法曰。寸口脈陰陽俱緊者。法當清邪中於上焦。濁邪中於下焦。皆文異旨近。又陶氏本草序例曰。夫病之所由來雖多端。而皆關於邪。邪者不正之目。謂非人身之常理。風



微也。其為病內經有分屬。仲景括為一百八病。蓋因腑之六。以為數也。凡此共二百三十四病。統內外而言之也。人之一身。上下表裏盡之矣。而所謂清濁大小邪者。一為霧露。一為地濁。本天者親上。本地者親下。百病之長。傷人之陽。肅殺之氣。傷人之陰者。是也。從口入者為內傷。亦足使人發熱腹痛。喘嘔脹滿。不去其陳而致新。不足以為功。魏大約陽病皆軀殼以外之病。而陰病皆軀殼以裏之病耳。

按此條分為兩段。前段是就經絡藏府而舉疾證數目。

程注

錯算。周氏為是。○後漢書郭玉傳。方診六微之技。亦不審其義。後段說五邪而分三節。先

就其性立名。

風善行而數變。其性見千金。

更反復示其所中。餘義結以

漢晉人多言脫如何。亦或也。胡三省通鑑注云。脫者。或也。又曰。脫者。未可必之辭也。此皆可例。

問曰。陽病十八。何謂也。

飢類聚作飢

周此總內經所著之病。而爲之分陰陽。悉表裏。合上下內外。以立言。庶幾經絡明。腑臟著。所因顯。不致散而難稽也。如三陽在外。病頭痛等六證。則各有所行之經。各顯本經之證。三而六之。非十八乎。而三陰之在裏者亦然。五臟各有十八。合計爲九十病。其爲病。則於靈樞論心脈爲癰癧。班班可考矣。若六腑則何如。腑居內而合於經者也。故邪之在腑者。合外於經。其受患爲淺。而欲散不難。不若五臟之深且甚焉。故曰。



厥下原注曰脈證見上卷者。徐鎔以爲此條則殆是扁鵲所療虢太子之病也。又素陽明脈解篇。厥逆連臍則死。連經則生。

問曰。脈脫入臍卽死。

按先兄曰。此條諸注失鑿。蓋是承上條。更申其理。脈卽血脈。係血氣之省文。攷字書。脫或然之辭。宜爲助語看。始安。脫本外脫之義。脫而稱入。甚不相協。素方盛衰論。脈脫不具。診無常行。吳崑注云。脈或不顯也。可以相證矣。吳子勵士篇。脫其不勝。取笑於諸侯。後漢書李通傳。事旣未然。脫可免禍。宋趙德麟侯鯖錄曰。脫者。可也爾也。謂不定之詞。

按朱以上焦下焦二句為虛者不治之注腳。謬矣。又魏注中筋脈二字宜刪。

師曰寸口脈動者。

按此條。上文言脈不言色。下文言色不言脈。是互文見意。故結以非其時色脈句。

問曰有未至而至。

為至而不至也。上俞本類聚並有此字。

徐此論天氣之至有過不及不言及醫然而隨時制宜之意。

在其中。

輯義尤注中至未得甲子下脫而天已溫或已得甲子而天反未溫及已得甲子十九字。

問曰寸脈沈大而滑。

脈經不設問答卒厥下有不知以三字口字无和上有溫字。

按此條。脈經題云平卒尸厥脈證。

巢源載之尸厥候中。

而雜療方尸



師曰。息搖肩者。心中堅。

按趙曰。此仲景因呼息以爲察病之法。與後條吸對言。以舉端耳。徐注本于此。又沈氏以爲此言喘息有痰氣肺脹肺痿之別。其說似是。然不及魏之穩切。但魏唾沫解恐非。沈曰。肺熱葉焦。氣弱不振。津液化而爲涎。上溢於口。故吐涎沫。似是。蓋古所謂沫者。卽今之痰涎。不必是白沫。宜參肺痿及痰飲篇又金鑑痰嗽肺痿之辨。欠安。

又按徐氏注上氣色條有曰。但望法貴在神氣動靜之間。此言甚妙。如欲候氣息者。最所宜加思矣。

師曰。吸而微數。

沈作息而微數。且曰。遠當作遲字。並誤。

莫不稟受于肺。而五藏之真色亦必隨氣之出入而發見于鼻頭。此鼻頭所以可驗五藏之真色也。此解與尤意異。然宜備一說。痰飲篇曰。膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。蓋與本條相發。又色黃者。色白者。二證。沈魏朱屬之鼻頭。檢千金方曰。論云。鼻頭微白者。亡血。設令微赤。非時者。死。病人色白者。皆亡血也。又曰。凡人候鼻頭色黃。法小僂難也。蓋是三家所本。

師曰。病人語聲寂然。

按。暗。當與齟通。周禮典同職。微聲齟。鄭玄注。齟。聲小不成也。



內因一段。四肢才覺重滯四句。應前外因一段。要能無犯王法二句。應前房室一段。並是。然要就服食節其冷熱苦酸辛甘句攷之。則三者房室下。恐脫服食二字。否則彼句內。蘊有服食失節乎。如此看做。殆覺上下相應。於病理亦相叶。而要能無犯王法以下五句。都應前房室一段。

又按喜多邨直寬曰。服食。即衣服飲食之謂。靈師傳篇云。飲食衣服。亦欲適寒溫。可以徵焉。斯說得之。小島尚質曰。陳天竺三藏

真諦譯迦毘羅仙人金七十論云。三苦。一依內。二依外。三依天。此亦論三因與經旨略相似。

問曰。病人有氣色見於面部。胸上。周作胸中。

按魏曰。鼻為肺之開竅。而主一身之元氣者也。五藏之氣。

夫人稟五常因風氣而生長

稟周本作秉

按禮記樂記曰。道五常之行。注。五常。五行也。禮運曰。故人者。其天地之德。陰陽之交。鬼神之會。五行之秀氣也。又曰。故人者。天地之心也。五行之端也。楊上善太素經注曰。風氣一也。徐緩爲氣。急疾爲風。人之生也。感風氣以生。其爲病也。因風氣爲病。是以風爲百病之長。集韻般字下曰。亦數別之名。無犯王法。蓋謂無犯王者之法律。以羅墨劓剕宮等刑。白虎通曰。犯王法。使方伯誅之。先兄曰。竭乏。卽內經以欲竭其精之義。又金鑑以爲內所因中虛。外所因中實。不內外因。非中外虛實。徐氏以爲適中經絡三句。應前



徐醫中有大關目不可專指一病者。仲景于首卷特揭數十端以定治療之法。此則論五行相尅之理。必以次傳而病亦當預備以防其傳也。魏此條乃仲景總揭諸病當預圖於早。勿待病成方治以貽悔也。治之預則用力少而成功多。所謂曲突徙薪之勲。宜加於焦頭爛額之上也。先言肝者。以四時之氣始乎春。五臟之氣始於肝。洪範言履端于始。序則不愆。故先引肝。以爲之準云。朱甘味入脾。兼能緩肝。和調兩藏。令弗相戕也。

按趙氏於內經辛補。仲景酸補之理。詳爲之辨。蓋係于尤氏所據。文錄不具錄。

金匱玉函要略述義卷上

丹波元堅 學

按廣雅曰略要也。王念孫疏證曰孟子滕文公篇此其大略也。趙岐注云略要也。又說文曰略經略土地也。段玉裁注曰引申之凡舉其要而用功少者曰略略者對詳而言。觀此諸說則要略二字其義要晰矣。

○臟腑經絡先後病脈證第一

按傷寒論每篇首冠以辨字今要略無之者蓋後人所刪

也。外臺瘰癧方引張仲景傷寒論每條首有辨瘰癧病辨瘰癧脈等字亦足以證

論十三首

三當作五

脈證三條

諸本作二條字從

問曰上工治未病何也。



不存。不足措念。其他諸家。惜未得見之。況戴氏碩儒。顧攷證必精。而其遺書中。缺焉不收。最可憾也。又李炳字振聲。號曰西垣。苦金匱無善注。乃撰金匱要略注二十二卷。能抉其微。見焦循雕菰集。嘉慶中。陳念祖著有金匱淺註十六卷。金匱讀四卷。見其神農本草經讀序。

趙開美本。輯義所引。係皇國重刊。今得其原刻。勘之。間失其舊。又朝鮮國醫方類聚所據。蓋爲宋元舊刻。亦與今本互有異同。今竝校而揭之。



金匱玉函要略述義題辭

先教諭金匱輯義。係于晚年定本。是以極其精核。無須贅述。惟不肖受讀。既尚時有管見。又諸家方論。擴充經旨者。其偶爾失載。亦間有之。趙以德衍義。周揚俊補之。題曰二注。近代朱光被有正義之作。俱出于先教諭下世之後。竝擷其粹。皆標記在輯義上層。不敢謂有裨學者。然竊比之鷄肋。仍整錄爲編。以供子弟參對云。天保壬寅首夏。丹波元堅纂。

金匱注解。更有高世拭。李紱。李瑋。西俱爲醫宗金鑑所引。又有盧之頤。摩索金匱。張志聰注。黃元御金匱懸解。戴震注。李鈞注。皆是先兄醫籍攷所著錄者。盧氏。黃氏。學頗迂僻。其存



嘉永甲寅鐫

金匱述義

存誠藥室叢書



金

卷之義

備

上